

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

# Науковий часопис

НАЦІОНАЛЬНОГО  
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

СЕРІЯ 3

ФІЗИКА І МАТЕМАТИКА У ВИЩІЙ І  
СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

ВИПУСК 5

Київ 2009

<b>Курченко О.О., Рябець К.В.</b> Два узагальнення теореми Коші для диференційованих функцій у курсі математичного аналізу.....	<b>104</b>
<b>Ленчук І.Г., Михайленко В.Є.</b> Професійна підготовка студентів засобами пізнавально – візуального навчання азам позиційної стереометрії.....	<b>115</b>
<b>Панченко Л.Л., Шаповалова Н.В.</b> Система контролю знань з математичного моделювання.....	<b>122</b>
<b>Піхтар М.П.</b> Підхід «Листків» в гуртковій роботі з учнями Малої Академії наук.....	<b>132</b>
<b>Харламова Л.Д., Петров В.В.</b> Специфіка навчання курсу «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» студентів технікумів (коледжів) в аспекті вимог компетентнісної освіти...	<b>142</b>
<b>Чепорнюк І.Д.</b> Вивчення основних понять теорії інформації у курсі теорії ймовірностей	<b>151</b>
<b>Швець Л.В.</b> Психолого – дидактичні передумови формування і розвитку в старшокласників графічних вмінь під час вивчення стереометрії.....	<b>159</b>
<b>Шкільний О.В.</b> Різні аспекти тлумачення поняття «Якість освіти».....	<b>166</b>

## ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПІЗНАВАЛЬНО-ВІЗУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ АЗАМ ПОЗИЦІЙНОЇ СТЕРЕОМЕТРІЇ

*Ленчук І.Г.,*

*кандидат технічних наук,*

*ЖДУ імені Івана Франка,*

*Михайленко В.Є.,*

*доктор технічних наук, професор,*

*Київський Національний університет будівництва та архітектури*

Пропонується викладачам геометрії, методистам університетів, учителям математики ЗОШ погодитися, що важлива позиційна задача на перетин тіла площиною розв'язується виключно методом внутрішнього проєкціювання, а метод слідів (взаємно однозначної відповідності) є лише його особливим частинним випадком.

Предлагается преподавателям геометрии, методистам университетов, учителям математики общеобразовательных школ согласиться, что важная позиционная задача на пересечение тела плоскостью решается исключительно методом внутреннего проецирования, а метод следов (взаимно однозначного соответствия) является лишь его особым частным случаем.

We propose to teachers of geometry, methodists of universities, teachers of mathematics of secondary schools to agree, that the important position problem about the intersection of the body by plane, that is solved solely by the internal projection, and the trace method (one-to-one correspondence) is only its special case.

**Постановка проблеми.** Сьогодні досить важко безпомилково назвати дату та прізвище особи, з чієї „легкої руки” в часи формування методологічної системи поглядів у конструктивній стереометрії започатковано в обіг назви двох нібито різних прийомів побудови перерізів тіл площиною загального розташування, як-от: „Метод внутрішнього проєкціювання” та „Метод слідів”. Очевидно, що така, не зовсім виважена ідіома диференціації методів, була зумисне озвучена з єдиною метою, щоб в якості особливого елемента конструкції категорично вирізнити із загальногеометричної схеми закономірних побудовних дій слід січної площини на площині основи тіла, котрий деінде допомагає – пришвидшує та оптимізує процес вирішення важливої позиційної задачі. Прикро, але не всі поважні інтерпретатори й оповідачі можливих рисункових варіацій на цю тему змістовно строго сприйняли привнесений фразеологізм. Які понятійні підвалини кожного з методів? Що спільного і чим вони відрізняються?

**Аналіз останніх досліджень.** Не секрет, що в переважній більшості навчальних посібників і, навіть, підручників, адресованих учителеві чи учневі, де висвітлюються питання образно-наочного представлення позиційних задач, немає належної уваги до їх геометричного тлумачення. Оцінюючи наявну педагогічну ситуацію словами вітчизняних геометрів-методистів В. Є. Михайленка та І.Ф. Тесленка, висловлених на адресу дещо інших конструктивних реалій, констатуємо: „В них часто переважає рецептура того „як робити?”, а питання „чому?” залишається відкритим” ([1], с. 18).

й той у примітивному трактуванні, далекому від наукового. Чомусь без ґрунтовних пояснень, за принципом „роби як я” чи „як показано на малюнку”(?), коротко описується варіант відшукання перетинів із січною площиною граней багатогранника, й тільки.

У класичній, загалом змістовній, якісній книзі „Методика викладання стереометрії”, виданій колективом відомих освітян за редакцією О. М. Астряба і О.С. Дубинчук, говориться: „Існує два способи розв’язання задачі на перерізи на проєкційному рисунку: 1) спосіб відповідності, 2) спосіб слідів”. Щоб глибше осягнути перший із них, відразу ж додаються посутні пояснення: „Спосіб відповідності ґрунтується на взаємно однозначній відповідності точок шуканого перерізу і точок нижньої основи багатогранника ” ([3], с. 208). Потім окремо виписано зауваження: „Цей метод краще називати методом внутрішнього проєкціювання, але в умовах шкільної роботи його краще називати методом відповідності, бо цей термін зрозуміліший учням” ([3], с. 209). Мимоволі з’являються небезпідставні сумніви стосовно еквівалентності назв методу, окрім того, варто посперечатися із приводу кращого чи гіршого розуміння кожного терміну учнями.

Не ориґинальні в зазначеному сенсі й навчальні посібники, видані на допомогу вчителю значно пізніше – в 90-ті рр. минулого століття [4,5]. Той самий підхід, ті ж принципи, хоч і корисних прикладів для справи здобуття графічних навичок у побудові перерізів тіл площиною (навіть, циліндра і конуса) значно більше.

**Основна частина.** Ми глибоко переконані, що мовчазно-компромісний стан речей з дивними, на наш погляд, недомовками в навчанні конструктивній стереометрії помилковий, а традиційні установки на подання учням підвалин позиційних перетворень на проєкційному кресленні недосконалі, місцями алогічні, й тому – неправильні.

Тож найперше з’ясуємо, яке походження терміну „внутрішнє проєкціювання за напрямом бічних ребер”?, яка його природа? Вчителю математики це конче потрібно знати, тим паче, що справжні знання першопредмету приходять через його розуміння.

Нехай площина  $\Pi$  (рис. 1) є картинною площиною (дошка, зошит), а  $a$  – напрямом проєкціювання ( $a \perp \Pi$ ). Візьмемо трійку найпростіших об’єктів геометрії: точку  $A'$ , пряму  $p'$  і площину  $\Sigma'$ , загально розташовані відносно визначеної площини проєкцій  $\Pi$ . Спроєкціюємо  $A'$ ,  $p'$  і  $\Sigma'$  на площину  $\Pi$  за напрямом  $a$ . В результаті одержимо їх паралельні проєкції  $A$ ,  $p$  і  $\Sigma$  відповідно. Тепер, не без задуму, абстрагуємося в думці від ориґіналу, тобто уявимо собі лише картинну площину  $\Pi$  із зображеними на ній точкою, прямою і площиною. Чи можна за цим кресленням з’ясувати взаємне розташування у просторі перерахованих геометричних об’єктів? Безумовно, що ні! Єдине, що можна стверджувати категорично, то це, що точка  $A'$  не належить прямій  $p'$  ([2], § 2, п. 13). На запитання „Як взаємно розташовані точка і площина, пряма і площина?”, або (знаючи напевне, що пряма не паралельна площині) „Як установити точку перетину прямої і площини?”, дати однозначну відповідь неможливо, оскільки такі зображення найпростіших геометричних фігур на картинній площині  $\Pi$  об’єктивно не вміщують у собі відповідної інформації, тобто вони є позиційно невизначеними.

Подолати невизначеність, дійти позиційної злагоди на проєкційному кресленні можна наступним прийомом. Побудуємо спочатку паралельні проєкції точки  $A'$  і прямої  $p'$  ( $B'C'$ ) на

площину  $\Sigma'$  ( $K'L'M'$ ) за деяким напрямом  $a'$ , не паралельним  $\Sigma'$ , а потім спроекціюємо одержану просторову модель на площину зображень  $\Pi$  за напрямом  $a$ , тобто виконаємо не одне, а два упорядковані проєкціювання (рис. 2). Матимемо уявлювану конструкцію, в якій точка, пряма і площина вже не будуть окремо взятими геометричними об'єктами, довільно розташованими у просторі, а такими, що жорстко пов'язані між собою певною стереометричною фігурою, в нашому конкретному випадку – призмою. Нижня основа трикутної призми – трикутник  $A'_1B'_1C'_1$  – належить площині  $\Sigma'$ , верхня основа паралельна нижній, її розташування у просторі не суть важливо, а бічні ребра  $A'A'_1$ ,  $B'B'_1$  і  $C'C'_1$  є проєкційвальними прямими на  $\Sigma'$  за напрямом  $a'$ . До речі, такий зв'язок між точкою, прямою і площиною можна принагідно встановити не лише через паралельне проєкціювання за визначеним напрямом  $a'$ , а й за допомогою центрального проєкціювання з визначеним центром проєкцій  $S'$  (рис. 3). У цьому випадку пов'язуючою стереометричною фігурою буде вже піраміда  $S'A'_1B'_1C'_1$ .

Тепер на площині креслення  $\Pi$  матимемо таке зображення призми (піраміди), на якому кожна вершина (точка) багатогранника визначається не тільки зображенням самої точки ( $A' \rightarrow A$ ,  $B' \rightarrow B$ ,  $C' \rightarrow C$ ), а й зображенням її проєкції на площину  $\Sigma'$  ( $A'_1 \rightarrow A_1$ ,  $B'_1 \rightarrow B_1$ ,  $C'_1 \rightarrow C_1$ ). Інакше кажучи, на картинній площині  $\Pi$  побудовано не лише зображення точки  $A'$ , прямої  $p'$  і площини  $\Sigma'$ , а також зображення їх проєкцій на  $\Sigma'$  ( $\Sigma'_1 \equiv \Sigma'$ ) разом із апаратом первісного паралельного (чи центрального) проєкціювання. Очевидно, що в цьому останньому варіанті позиційна поінформованість про задані найпростіші фігури помітно зросла.

Отож, за введених умовностей, точка на площині проєкцій  $\Pi$  визначатиметься своїм власним зображенням і зображенням своєї ж проєкції на деяку площину  $\Sigma'$ . Тут точку  $A_1$ , приміром, називають *вторинною проєкцією точки  $A'$* , адже  $A'$  спочатку проєкціюють визначеним методом на площину  $\Sigma'$  у точку  $A'_1$ , а потім останню паралельним проєкціюванням – на площину  $\Pi$  в точку  $A_1$ . Проєкціювання на площину  $\Sigma'$ , що в динаміці дії є першим, називають *внутрішнім*, оскільки воно виконується “всередині” – паралельно ребрам (твірним) призми чи циліндра або з вершини піраміди чи конуса. Внутрішнє проєкціювання може бути або паралельним (циліндричним), або центральним (конічним). Інше ж проєкціювання (друге в упорядкованій парі), тепер вже на площину проєкцій  $\Pi$ , називають *зовнішнім*. Воно, відповідно до вибору методу зображень в шкільних реаліях, завжди є виключно паралельним. При цьому площину  $\Sigma$  на зображенні називають *основною площиною*, оскільки вона є паралельною проєкцією площини основи  $\Sigma'$  певної пов'язуючої стереометричної фігури, а точки  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  – *основами точок  $A$ ,  $B$ ,  $C$*  відповідно. Нарешті, відрізки  $AA_1$ ,  $BB_1$  і  $CC_1$ , що зображають на картинній площині  $\Pi$  промені внутрішнього проєкціювання  $A'A'_1$ ,  $B'B'_1$ ,  $C'C'_1$  відповідно, називають, за термінологією М. Ф. Четверухіна, *“шпичками”*.

Таким чином, будь-яка точка простору вважається заданою на проєкційному кресленні, якщо на ньому зображено точку і її паралельну (центральну) проєкцію на основну площину (основу). У свою чергу, якщо на кресленні кожна точка стереометричної фігури є заданою, то зображення такої фігури називається *позиційно визначеним або повним*. Іншими словами, зображення просторової фігури є повним, якщо всі її елементи задані.

Отже, нами щойно доказово й вичерпно з'ясовано геометричну суть методу зображень просторових фігур за допомогою упорядкованого **внутрішньо-зовнішнього проєкціювання**, що за певних суб'єктивних умов може забезпечити вірність зображень, наочність розміщення цих фігур на картинній площині, а також сприятиме виконанню ефективних (однак, дещо обмежених за змістом) побудов на готовому проєкційному кресленні.

Напевне, що *повні зображення цілком характеризують об'єкт позиційно*. За нього можна зробити висновок про розміщення його окремих елементів відносно інших. На ньому можна шукати і знаходити спільні елементи (інциденції) двох заданих на кресленні геометричних фігур, тобто – розв'язувати позиційні задачі.

Тож уявляючи в динаміці процес формування на картинній площині якісного зображення стереометричного тіла, учень пізнає природу **методу внутрішнього проєкціювання** “за напрямом бічних ребер”. Тепер уже немає сумнівів, що метод внутрішнього проєкціювання в геометрії не є надуманим, тому його слід сприймати як органічно невід'ємну складову переважної більшості побудовних операцій. Зрозуміло, що конус (піраміда), циліндр (призма) і куля, зображені на дошці (в зошиті) звичним прийомом із дотриманням указаних вимог, позиційно визначені й на них можна саме методом внутрішнього проєкціювання побудовно строго розв'язати будь-яку задачу на інциденції, зокрема – на перерізи стереометричних тіл площиною, що досить часто трапляється в обчислювальних задачах ЗОШ.

Натомість зараз підійдемо до охарактеризування складових розглядуваного питання дещо з іншого боку, з інших теоретичних засад, уявлювано строго опрацьованих видатним російським геометром М. Ф. Четверухіним. Додамо якомога стисло і містко переказ основ ключового дійства в геометрії – проєкціювання [6].

Нехай нам задано у площині  $\Sigma_1$  (рис. 4, а) деяку плоску фігуру  $\Phi_1$ , наприклад трикутник  $A_1B_1C_1$ . Припустимо, що його потрібно спроєкціювати з точки  $S$  (центр проєкції) на площину  $\Sigma$  (площина проєкцій чи зображень). Це роблять наступним чином. Кожну вершину трикутника  $A_1, B_1, C_1$  сполучають із центром  $S$  і знаходять точки перетину  $A, B, C$  проєкціювальних прямих  $SA_1, SB_1, SC_1$  із площиною зображень  $\Sigma$ . Трикутник  $ABC$  називають **центральною проєкцією** або **перспективою** трикутника-оригінала  $A_1B_1C_1$ .

Так, загалом, кожній точці площини  $\Sigma_1$  можна поставити у відповідність цілком певну точку площини  $\Sigma$  і навпаки<sup>1</sup>. Через це говорять, що центральне проєкціювання встановлює **взаємно однозначну відповідність** між двома плоскими точковими полями  $\Sigma_1$  і  $\Sigma$ : „При цьому кожну фігуру площини  $\Sigma_1$  треба розглядати як місце точок, якому відповідає перспективна фігура – місце точок на площині  $\Sigma$ ” ([6], с.21). Істотною властивістю відповідності є те, що: *всякій прямій одного плоского поля відповідає пряма іншого поля*. Справді, якщо взяти у площині  $\Sigma_1$ , скажімо, пряму  $A_1B_1$ , то проєкціювальні прямі  $SA_1$  і  $SB_1$  утворюють проєкціювальну площину  $SA_1B_1$ , яка перетинає площину зображень  $\Sigma$  вздовж відповідної прямої  $AB$ . Наголосимо, що пряма перетину площин  $\Sigma_1$  і  $\Sigma$  є особливою прямою в цій перспективній відповідності: *кожна точка прямої  $s$  (див. рис.), що розглядається як*

<sup>1</sup> У випадку, коли проєкціювальний промінь паралельний площині  $\Sigma$ , вважатимемо, що він перетинає останню в нескінченно віддаленій точці.

оригінал, збігається із своєю проекцією, а отже, вся пряма сама собі відповідає. Ця пряма називається **віссю** перспективної відповідності двох площин.

Коли ж точку  $S$  в уявленнях віднести в нескінченність, то проекційвальні промені  $SA_1$ ,  $SB_1$ ,  $SC_1$  будуть паралельні (рис. 4, б) деякому напрямку  $a$ , непаралельному жодній із площин  $\Sigma_1$  і  $\Sigma$ . Тут між площинами  $\Sigma_1$  і  $\Sigma$  встановлюється перспективна відповідність особливого виду, яку називають **перспективно-афінною** (або **спорідненою**). Як і в загальному випадку, у спорідненій відповідності *будь-якій прямій площині  $\Sigma_1$  відповідає єдина пряма площини  $\Sigma$ , й ця відповідність має своєю віссю лінію перетину  $s$  площин  $\Sigma_1$  і  $\Sigma$ , а всі точки прямої  $s$  подвійні*. Крім цього, перспективно-афінна відповідність має ще дві особливі властивості: *зберігається паралельність прямих і зберігається відношення відрізків на прямій*. Цікаво, що виділені **три базові** властивості паралельного проєкціювання є змістовною складовою теми „Зображення просторових фігур на площині” у стереометрії ЗОШ, там вони строго доведені ([2], п.13, с.10). Ситуаційна ж відмінність підходів до висвітлення цих властивостей полягає лише в тому, що у шкільному варіанті точки і прямі, як оригінальні об’єкти проєкціювання, вибираються будь-де у просторі, а не в задалегідь визначеній площині  $\Sigma_1$ , проте це суті справи не змінює.

А тепер, задля виваженого з’ясування геометричного змісту кожного з методів, посилаючись до уявлень та візуального супроводу міркувань якісними проєкційними кресленнями, спробуємо оперувати виключно достовірними фактами й категоріями логіки.

Найперше зауважимо, що строго обґрунтовуючи об’єктивно природне походження терміну „внутрішнє проєкціювання”, ми жодним словом не обмовилися щодо взаємно однозначної відповідності двох якихось площин. Й не дивно, адже *характеристичними пріоритетами цього уявно-динамічного дійства* в геометрії є вражаюче інші поняття та закономірності, а саме: 1). *Усяке ребро піраміди чи призми (твірна конуса чи циліндра) належить проєкційвальному променю, який вироджується на площину основи тіла в точку*. 2). *Бічна поверхня піраміди чи призми (конуса чи циліндра) теж є проєкційвальною й вироджується на площину основи у багатокутник (коло) основи, частково, кожна окремо взята бічна грань багатогранника вироджується у відрізок – відповідну сторону багатокутника основи*. Таким чином, тут ми безапеляційно маємо справу виключно із проєкційвальними прямими, площинами і поверхнями, вироджені проєкції яких, як результат внутрішнього проєкціювання, володіють так званою **збиральною властивістю**: *будь-яка точка проєкційвальної прямої, а також, будь-яка точка, пряма чи інша фігура бічної поверхні тіла, зокрема, проєкційвальної площини (грані багатогранника) має свою основу – проєкцію за напрямом бічних ребер, розташовану відповідно на виродженій (слід-) проєкції прямої або ж поверхні (площини)*. Саме ця, напрочуд елементарна в уявленнях прописна істина, вкупі з поняттям „належності” точок, прямих і площин, складають достатню умову успішної графічної реалізації методу внутрішнього проєкціювання на всякому позиційно визначеному проєкційному кресленні, *якраз у цьому, й винятково в цьому проявляється геометрична сутність методу*.

Нарешті, щоб розумом осягнути ступінь ідентичності методів внутрішнього проєкціювання і слідів, вирізнити їх споріднені та розрізняльні риси і остаточно визначитися з термінологією, зумисне повернемося до рисунка 4. На ньому наочно проілюстровано січну

відомо, взаємно однозначну відповідність, яку у випадку **центрального** внутрішнього проєкціювання краще всього задавати центром  $S$ , парою відповідних точок  $A$  і  $A_1$  та віссю  $s$ , а у випадку **паралельного** внутрішнього проєкціювання – парою відповідних точок  $A$  і  $A_1$  та віссю  $s$ . Що ж започаткувало, спонукало з'яву такої взаємно однозначної відповідності двох площин? – звичайно ж, дія внутрішнього проєкціювання! В побудові інших пар відповідних елементів цієї справді чудової відповідності (напр.,  $B$  і  $B_1$  чи  $C$  і  $C_1$ ), потрібно скористатися такими двома її характеристичними властивостями: 1) *всяка пара відповідних точок належить променю внутрішнього проєкціювання*; 2) *будь-яка пара відповідних прямих перетинається на осі відповідності  $s$*  (див. правило-орієнтир у три кроки, навчч відображене на рис. стрілками).

Отже, слід  $s$  площини  $\Sigma$  на площині  $\Sigma_1$  є лише окремим допоміжним робочим інструментом конструктивних пошуків перерізу, й тому, швидше всього, саме **метод слідів** варто перейменувати в **метод відповідності**, що звучить переконливо й більш значимо, *але в жодному разі – не метод внутрішнього проєкціювання*, оскільки *останній охоплює, включає в себе метод слідів (відповідності), тобто точкова взаємно однозначна відповідність площини перерізу і площини основи тіла об'єктивно індукована природою внутрішнього проєкціювання за напрямом бічних ребер*.

**Висновки.** Всім відомо, що будь-яка руйнація стереотипів – поранка з розряду невдячних. Можливо й нам не варто було ревізувати усталені, традиційні підходи висвітлення такого, як здавалося, несуперечливого й простого в конструктивній стереометрії питання: „Перерізи тіл площиною”. Однак, за тезою старовічних – „істина дорожче”! Особливо, коли справа стосується педагогічних аспектів методики навчання геометрії майбутніх учителів.

Як з'ясувалося, реально існує **єдиний природний метод** побудовного подання популярної в геометрії позиційної задачі – **метод внутрішнього проєкціювання за напрямом бічних ребер**, назва якого відображає єство одноіменного динамічного перетворення всередині стереометричного тіла та геометричну сутність уявних і рисункових дій учня. Взаємно однозначна відповідність між точками січної площини та площини основи тіла безперечно навчч проглядається в методі, однак, лише „міжрядково”, в якості цікавого результативного компоненту операції внутрішнього проєкціювання, а слід січної площини, у свою чергу, є одним із визначальних елементів такої перспективної (перспективно-афінної) відповідності двох площин, який в багатьох випадках просто неможливо зобразити на проєкційному кресленні, оскільки цілком можливо, що він за даними умови задачі розташовується поза межами формату дошки (зошита).

Таким чином, **метод слідів** принципово немислимий у графічній реалізації без свідомого задіяння методу внутрішнього проєкціювання, й навпаки, **метод внутрішнього проєкціювання** цілком автономний і самодостатній, для його застосування слід категорично не обов'язковий. Іншими словами, **метод слідів (відповідності)** є лише **частинним випадком методу внутрішнього проєкціювання**, хоч інколи вже побудований слід на проєкційному рисунку виявляється дуже ефективним посередником у вирішенні серйозних питань теорії і практики конструктивної стереометрії (див., напр., [7]).



## Список використаної літератури

1. Михайленко В.Є., Тесленко І.Ф. Зв'язки у викладанні геометрії і креслення. – К.: Радянська школа, 1965. – 82 с.
2. Погорелов О.В. Геометрія: Стереометрія. // Підручник для 10-11 кл. серед. шк. – К.: Освіта, 2002. – 129 с.
3. Методика викладання стереометрії. / За ред. О.М. Астряба і О.С. Дубинчук. – К.: Радянська школа, 1956. – 280 с.
4. Гольдберг Я.Е. З чего начинается решение стереометрической задачи. / Пособие для учителя. – К.: Радянська школа, 1990. – 120 с.
5. Жовнір Я.М. Позиційні задачі в стереометрії. / Посібник для вчителя. – К.: Освіта, 1991. – 96с.
6. Четверухін М.Ф. Рисунки просторових фігур у курсі геометрії. / Посібник для вчителів– К.: Радянська школа, 1953. – 188 с.
7. Ленчук І.Г., Боравлєв А.Ф. Построение опорных точек конических сечений на проекционно-полном чертеже Четверухина. // Сб. науч.-метод. ст. «Начертательная геометрия и инженерная графика». – М.: Из-во МПИ, 1990. – Вып. 17. – С. 112-119.




Рис. 1




Рис. 2






Рис. 3



a)



b)



# НАУКОВИЙ ЧАСОПИС

НАЦІОНАЛЬНОГО  
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

СЕРІЯ 3

ФІЗИКА І МАТЕМАТИКА  
У ВИЩІЙ І СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

ВИПУСК 5