

Особливості утримання та розмноження *Theodoxus fluviatilis* (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) в умовах лабораторного акваріума

Встановлено оптимальні умови утримання *Theodoxus fluviatilis* (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae), з'ясовано терміни настання статевої зрілості цих молюсків та особливості утворення кладок в умовах лабораторного акваріума.

Ключові слова: молюски, *Theodoxus fluviatilis*, акваріумне утримання, розведення, кладки.

Постановка наукової проблеми та її значення. Родина Neritidae у світовій фауні представлена понад 10 родами [4]. Тропічні представники родини (молюски роду Neritina) популярні серед акваріумістів завдяки великим розмірам, яскраво забарвлений черепашці і здатності очищувати акваріуми від водоростевих обростань, не пошкоджуючи при цьому вищих водних рослин. У континентальних водоймах Європи мешкають представники лише одного роду – *Theodoxus*. У світовій фауні присноводних та частково солонуватоводних представників роду *Theodoxus* нараховується значна кількість видів – приблизно 30–40 [1; 3]. В Україні цей рід представлений трьома видами – *Th. fluviatilis* (Linnaeus, 1758), *Th. danubialis* (C. Pfeiffer, 1828), *Th. astrachanicus* (Starobogatov in Starobogatov, Filchakov, Antonova et Pirogov) [5]. Вони мешкають у басейнах Дністра, Дунаю, Дніпра, Південного та Західного Бугу, Сіверського Дінця, а також у лиманах та північній частині Азовського моря [1; 3; 5].

З усіх теодоксусів *Th. fluviatilis* – найпоширеніший і найвідоміший вітчизняний вид, його українська назва – «лунка річкова». Ці молюски мають напівяйцеподібну товстостінну гладеньку черепашку з боковим дво-трибертовим завитком і напівокруглим устям, що закривається кришечкою. До найвиразніших якісних конхіологічних ознак молюсків роду *Theodoxus* належать забарвлення конхіолінового шару черепашок і характер малюнка на ньому. Для *Th. fluviatilis* ці дві конхіологічні

© Тарасова Ю., 2014

ознаки характеризуються вражаючою мінливістю, особливо забарвлення конхіолінового шару черепашки, яке може варіювати від популяції до популяції залежно від впливу умов існування (рис. 1).



Рис. 1. Варіації забарвлення конхіолінового шару черепашки та характер малюнка *Th. fluviatilis* українських популяцій

Ці молюски відіграють важливу роль у циркуляції речовин та трансформації енергії у природних екосистемах, характеризуються високою інтенсивністю фільтрації води. Лунки також здатні окислювати розчинені у воді органічні речовини, сприяючи при цьому природному самоочищенню водойм [4]. Лунка річкова – цікавий об’єкт для сучасної акваріумістики. Вона може бути важливим елементом складної і певною мірою саморегульованої біосистеми сучасного акваріума.

Аналіз досліджень цієї проблеми. До теперішнього часу чимало уваги було приділено дослідженням особливостей екології лунок у природному середовищі. Лунка річкова заселила прісні води не так уже й давно – 400 тис. років тому [4]. При цьому молюск не покинув і солоних вод – за деякими джерелами він може витримувати солоність до 5 % (а саме така солоність спостерігається влітку у приазовських річках), за іншими – лише 1,3 % [2]. Це свідчить про те, що цей гідробіонт у водоймах регіону перебуває на межі витривалості. Такі умови спричиняють інтенсивні коливання чисельності виду та мозаїчний характер його поширення.

Лунки належать до оксифільних реофільних молюсків. Завдяки плоскій нозі з широкою підошвою і потужним розвитком м’язів ці тварини способом пневматичного присмоктування щільно прикріплюються до субстрату у водоймах зі швидкою течією.

Серед інших черевоногих молюсків України лунки вирізняються тим, що протягом року ведуть активний спосіб життя (у них немає зимової сплячки). Взимку при температурі води +4 °C (і за відсутності, і за наявності льодоставу) у *Th. fluviatilis*, які трапляються, травний тракт завжди заповнений як щойно заковтнутим, так і напівперетравленим кормом (водоростево-бактеріальним нальотом і дрібним детритом, зішкрябаним за допомогою терток з поверхні субстрату, на якому перебувають ці тварини).

Як свідчать результати наших досліджень і літературні відомості, які стосуються прилеглих до західних кордонів України теренів Європи [5; 8], тут в останні 25–30 років у популяціях *Th. fluviatilis*, приурочених до тих біотопів, що протягом усього теплого періоду року добре прогріваються, процес яйцепладки в одно- дворічних особин (минулорічне та позаминулорічне покоління) розпочинається не в першій–другій декадах квітня, а на 1–1,5, а то й на дві декади раніше. Саме в означений проміжок часу на камінні, занурених у воду колодах дерев, порожніх черепашках черевоногих і двостулкових молюсків, на черепашках живих *Th. fluviatilis*, зрідка – на стеблах і листі вищої водяної рослинності, траплялися кладки цієї лунки, міцно прикріплени (конхіолінове приростання) до субстрату. Оболонка кладки (сінкапсула) щільна, двошарова. Зовнішній потужніший шар її утворений конхіоліном, внутрішній (значно тонший) – білковими речовинами. Кожний із цих шарів формується

секретами, що їх виділяють різні ділянки шкарадупової залози самок. Кожна сінкапсула містить 65–172 яйцеклітини. Переважно вони округлі, зірка – дещо довгасті. У кожній кладці дробиться лише одна яйцеклітіна, решта ж слугують поживним матеріалом для зародка. Тривалість розвитку зародка залежить від температури довкілля і становить від 36 до 60 діб [7].

Зазначимо, що спеціальних наукових досліджень, присвячених утриманню *Th. fluviatilis* і одержанню їх кладок у лабораторних умовах, до цього часу не проводилося.

Метою нашого дослідження було встановити оптимальні умови утримання та розведення *Th. fluviatilis* у лабораторному акваріумі. Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: з'ясувати основні вимоги до субстрату, температури й твердості води, освітленості та аерації, раціону живлення *Th. fluviatilis*, визначити розмірно-вікову градацію черепашки молюсків і основні характеристики кладок.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Матеріалом дослідження слугували *Th. fluviatilis* з популяції р. Тетерева (Житомир) та наступні покоління, що зростали в лабораторних умовах. Спостереження тривали з весни 2011 р. до осені 2014 р., загалом обстежено 438 тварин.

У лабораторії молюсків утримували в акваріумах Aqua Plus ємністю по 50 л. Заселення молюсків проводили через три тижні після закладання акваріумів для отримання певної екологічної рівноваги водного середовища.

Воду замінювали один раз на тиждень (20 % об'єму). Через те, що лунки надають перевагу жорсткій воді, збагаченій кальцієм, який необхідний для побудови товстих стінок черепашки (за нашими попередніми спостереженнями у м'якій воді верхній шар черепашки руйнується, молюски не доживають до трирічного віку), воду для заповнення акваріумів брали з річки в місці збирання лунок, іноді використовували відстояну водопровідну. Для забезпечення потрібного режиму газообміну використовували електричні повітряні міні-компресори-фільтри НЛ-511, які забезпечували фільтрацію, переміщування та аерацию води цілодобово.

Нагрівання води тривало безперервно, температура утримувалася на рівні 25 °C. Освітлення здійснювали акваріумними лампами стандарту T5 упродовж 10–12 год на добу.

Оскільки у природних водоймах лунки живуть здебільшого на кам'янистому субстраті, живляться водоростями, що кріпляться до субстрату і рослинним та тваринним детритом, який вільно лежить на ньому, дно лабораторних акваріумів устеляли дрібним гранітним гравієм, узятым із місця збирання молюсків. Додатковим раціоном живлення для молюсків слугував ущільнений корм для придонних риб Tetra TabiMin. Залишки риб'ячого корму щодобово збиралі з дна акваріума, щоб запобігти його розкладанню і накопиченню отруйних речовин у воді.

Акваріуми також були засаджені такими водними рослинами, як елодея канадська (*Elodea canadensis*), валіснерія спіральна (*Vallisneria spiralis*), стрілолист звичайний (*Sagittaria sagittifolia*). Рослини лишилися непоникодженими лунками.

З'ясовуючи віковий склад молюсків, ми прийняли їх розмірно-вікову градацію (табл. 1), яку склали на підставі власних спостережень.

Таблиця 1
Розмірно-вікова градація *Th. fluviatilis*

Вікова група	Довжина черепашки, мм
Цьоголітки (менше року)	0,5–5,6
1-річні	5,7–8,7
2-річні	8,8–10,2
3-річні	10,3–14,8

Кладки *Th. fluviatilis*, що ми їх отримали, мали сферичну форму, були приплюснуті згори, сплющені, із середнім діаметром 0,45–0,55 мм. Кладка складалася із двох частин – базальної і апікальної, розділених грубо вираженим швом. Базальна й апікальна частини кладки різнилися своєю формою. Перша з них плоска (у вигляді пластинки округлої форми), а друга – опукла (у вигляді перевернутої дотори дном таріочки). Кладки спостерігалися на камінні, склі, оснащенні, рослинах, черепашках молюсків, частіше на незначній відстані одна від одної, рідко розміщувалися неодиноко (рис. 2).




Рис. 2. Кладки *Th. fluviatilis* на спинному і черевному боці черепашки молюска

Колір кладки набував спочатку яскраво-білого кольору, а з часом капсула тверділа і жовтіла. Тривалість розвитку зародка при постійній температурі води 25 °C становила від 27 до 42 діб. У лунок немає стадії личинки, тому з кладок, які до того часу набували коричнюватого відтінку, виходили сформовані маленькі молюски з напівпрозорою тонкою черепашкою без малионка. Довжина молоді сягала 0,3–1,2 мм. Молодь ми збирали та відсаджували в інший акваріум для подальших спостережень.

Через 10–13 тижнів у тих самих умовах молюски ставали статевозрілими і починали розмножуватися.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Лунка річкова – порівняно невибагливий в утриманні черевоногий молюск, головними її потребами є достатня кількість живлення та аерація води. Середній діаметр кладки 0,45–0,55 мм. При цілодобовій температурі 25 °C тривалість розвитку зародка становить від 27 до 42 діб, довжина молоді сягає 0,3–1,2 мм, статевої зрілості тварини досягають через 10–13 тижнів.

У подальшому доцільно з'ясувати основні вимоги до утримання та розведення в лабораторних умовах інших видів лунок української фауни. Такі відомості стануть у пригоді акваріумістам, а також потрібні для прогнозування флюктуацій щільності популяцій цих тварин.

Джерела та література

1. Анистратенко В. В. Класс Панцирные или Хитоны, класс Брюхоногие – Cyclobranchia, Scutibranchia и Pectinibranchia / В. В. Анистратенко, О. Ю. Анистратенко // Fauna Украины. В 40 т. Т. 29 : Моллюски, вып. 1, кн. 1 / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. – Киев : Велес, 2001. – 240 с.
2. Дегтяренко О. В. Сучасний стан популяції *Theodoxus fluviatilis* (Mollusca, Gastropoda) річок Північного Приазов'я / О. В. Дегтяренко // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах : матеріали V Міжнар. наук. конф. – Дніпропетровськ : Ліпа, 2009. – С. 46–47.
3. Жадин В. И. Методы гидробиологических исследований / В. И. Жадин. – М. : Высш. шк., 1960. – 189 с.
4. Старобогатов Я. И. Fauna моллюсков и зоогеографическое районирование континентальных водоемов / Я. И. Старобогатов. – Л. : Наука, 1970. – 371 с.
5. Тарасова Ю. В. Моллюски рода *Theodoxus* (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Тарасова Юлія Вікторівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І. І. Шмальгаузена. – К., 2011. – 20 с.
6. Glöer P. Süßwassermollusken / P. Glöer, C. Meier-Brook. – Hamburg : DJN, 1998. – 136 s.
7. Eichwald E. Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien in geognostisch mineralogischer, botanischer und zoologischer Hinsicht / E. Eichwald. – Wilno : Zawadzki, 1830. – 256 S.
8. Piechocki A. Mięczaki (Mollusca) / A. Piechocki. – Poznań : Pol. Acad. Nauk, 1979. – 187 s.

Тарасова Юлія. Особенности содержания и разведения *Theodoxus fluviatilis* (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) в условиях лабораторного аквариума. В статье приведены сведения об оптимальных условиях содержания *Theodoxus fluviatilis* (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae), а именно: об субстрате, температуре воды, освещенности и аэрации, кормовом рационе. Установлены размерно-возрастная градация

раковин моллюсков, сроки наступления половой зрелости и особенности кладок в условиях лабораторного аквариума.

Ключевые слова: *Theodoxus fluviatilis*, субстрат, кормовой рацион, размерно-возрастная градация раковин, разведение, кладки.

Tarasova Yuliya. The Features of Keeping and Cultivation *Theodoxus fluviatilis* (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) in a Laboratory Aquarium. The article deals with the optimal conditions of *Theodoxus fluviatilis* (Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) with the requirements to the substrate, the temperature and hardness of water, light and aeration, feeding ration. The size-age gradation of mollusk shells, the timing of sexual maturity and features of the oviposition in the condition of laboratory aquarium were analyzed.

Key words: *Theodoxus fluviatilis*, substrate, feeding ration, the size-age gradation of mollusk shells, cultivation, oviposition.

Стаття надійшла до редколегії
03.04.2014 р.