



ГЕОЛОГІЯ

Завдання лабораторних робіт

Частина 1

**Кафедра географії
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського**

ГЕОЛОГІЯ

Завдання лабораторних робіт

Частина 1

Для студентів I курсу за напрямом підготовки «Географія»

Вінниця 2017

Рекомендовано
рішенням кафедри географії
(протокол № 2 від 6 вересня 2017 року)

Корінний В.І. Геологія. Завдання лабораторних робіт. Частина 1. – Вінниця,
2017. – 26 с.

Рецензенти: *Цегельнюк П.Д., доктор геолого-мінералогічних наук;*
Бірюкова Н.В., кандидат педагогічних наук

Будова, властивості й склад Землі

ЗАВДАННЯ 1. Користуючись літературними даними (див. список літератури) скласти кольорову схему внутрішньої будови Землі. Схема складається в довільній формі, однак в ній повинні бути зазначені: назви геосфер (земна кора, верхня мантія, літифікована мантія, літосфера, астеносфера, шар Голіцина, нижня мантія, зовнішнє ядро, внутрішнє ядро), глибина їх простягання, розділи Мохоровичича та Віхерта-Гутенберга, швидкість проходження сейсмічних хвиль, агрегатний стан речовини, тиск, щільність і температура окремих глибин.

ЗАВДАННЯ 2. Користуючись даними навчальних підручників (див. список літератури) скласти кольорову схему будови земної кори. В схемі повинні бути відображені: континентальний та океанічний типи, їх товщина, назви шарів (осадочний, гранітний, базальтовий), швидкість проходження сейсмічних хвиль в кожному шарі, розділ Конрада. Зверніть увагу на те, що в сторону океану гранітний шар виклинюється поступово й зникає повністю біля підніжжя материкового схилу.

ЗАВДАННЯ 3. Користуючись даними таблиці 1 скласти кругову діаграму поширення хімічних елементів в земній корі.

Таблиця 1. Кларки найпоширеніших елементів земної кори (За О.П. Виноградовим)

Елемент	Кларк
Кисень	47,00
Кремній	29,50
Алюміній	8,05
Залізо	4,65
Кальцій	2,96
Натрій	2,50
Калій	2,50
Магній	1,87
Інші	0,97

Контрольні питання

1. Предмет і завдання геології.
2. Методи вивчення внутрішньої будови Землі.
3. Будова й основні типи земної кори.
4. Внутрішня будова Землі.
5. Хімічний склад Землі.
6. Теплове поле Землі та його джерела.
7. Магнітне поле Землі.

Література: 1, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20.

ТЕМА 2

Мінерали

ЗАВДАННЯ. Користуючись запропонованим визначником (таблиця 4), визначити і описати найважливіші мінерали, що рекомендуються навчальною програмою. Опис виконати за зразком таблиці 3.

Таблиця 3. Опис мінералів

Назва мінералу	Хімічний склад	Морфологія агрегатів	Колір	Риска	Блиск	Злом	Спайність	Твердість	Інші ознаки

Список мінералів

- Самородні елементи: графіт, мідь, сірка.
- Сульфіди: ауріпігмент, галеніт, кіновар, молібденіт, пірит, сфалерит, халькопірит.
- Галоїди: галіт, сильвін, флюорит.
- Оксиди та гідрооксиди: гематит, кварц, ільменіт, корунд, лімоніт, магнетит, опал, піролюзит, халцедон, хроміт.
- Карбонати: арагоніт, доломіт, кальцит, магнезит, малахіт, сидерит.
- Сульфати: ангідрит, гіпс, барит, мірабіліт.
- Фосфати: апатит.
- Силікати: актиноліт, альбіт, альмандин, берил, біотит, глауконіт, каолініт, лабрадор, мусковіт, нефелін, олівін, ортоклаз, родоніт, рогова обманка, серпентин, тальк.

Таблиця 4. Визначник мінералів

Назва мінералу і його хімічний склад	Форма агрегатів і найважливіші фізичні властивості
I група. Мінерали м'які (з твердістю меншою 2,5); драпаються нігтем	
<i>А. Мінерали з металічним блиском</i>	
Графіт C	Суцільні або землясті маси, таблички і луски, рідше кристали у вигляді шестикутних пластинок. Сингонія гексагональна. Колір залізисто-чорний до темного сталєво-сірого. Риска сірувато-чорна, блискуча. Блиск металовидний. Спайність цілком досконала. Листочки гнучкі, але не пружні. Твердість 1. Жирний на дотик, мастить руки, пише на папері.
Молібденіт (молібденовий блиск) MoS ₂	Найчастіше лускаті, листуваті пластинчасті агрегати. Сингонія гексагональна. Колір свинцево-сірий. Риска голубувато-сіра. Спайність цілком досконала. Листочки гнучкі, але не пружні. Твердість 1-1,5. Жирний на дотик, пише на папері.
Антимоніт (сурм'яний блиск, стибніт) Sb ₂ S ₃	Здебільшого волокнисті, променисті агрегати, рідше видовжено-призматичні, стовбчасті кристали з грубою штриховкою по довжині, іноді добре огранені друзи. Сингонія ромбічна. Колір свинцево-сірий до сталєво-сірого, іноді із синюватою побіжалістю. Риска свинцево-сіра. Спайність досконала. Злом дрібнораковистий. Твердість 2. Крихкий.
Піролюзит Mn O ₂	Натічні, щільні або землясті маси, нирковидні та гронovidні форми, іноді радіальнопроменисті агрегати, ооліти. Сингонія тетрагональна. Колір темно-сірий до чорного, матовий. Риска чорна, іноді синювато-чорна. Спайність досконала. Злом нерівний, занозистий, землястий. Твердість різна: від 2 у пухких і землястих різновидів до 5-6 у кристалічних. Мастить руки, крихкий.
<i>Б. Мінерали без металічного блиску</i>	
Каолініт Al ₄ [Si ₄ O ₁₀](OH) ₈	Здебільшого тонкодисперсні щільні маси, також землясті, порошокваті і лускаті агрегати. Сингонія моноклінна. Колір білий до сірого, матовий, від домішок може бути різних відтінків. Риска біла. Спайність цілком досконала. Твердість 1-2,5. На дотик жирний, в сухому стані прилипає до язика, легко поглинає вологу; будучи вологим утворює пластичну масу; має запах глини.
Тальк Mg ₃ [Si ₄ O ₁₀](OH) ₂	Листуваті, лускаті або суцільні щільні маси. Явних кристалів не утворює. Сингонія моноклінна. Колір білий або жовтуватий, зеленуватий, сіро-зелений. Риска біла. Спайність цілком досконала. Листочки гнучкі, але не пружні. Твердість 1. Жирний на дотик.

Назва мінералу і його хімічний склад	Форма агрегатів і найважливіші фізичні властивості
Сірка самородна S	Кристали – зрізані дипіраміди; друзи, щільні маси, зернисті агрегати, кірки, нальоти. Сингонія ромбічна. Колір жовтий, бурий і чорний від включень бітумів. Риска світло-жовта, безбарвна. Блиск жирний до алмазного. Спайність недосконала. Злом раковистий до нерівного. Твердість 1,5-2. Дуже крихка. Загорається від сірника, горить синім полум'ям, даючи різкий запах SO ₂ .
Ауріпігмент As ₂ S ₃	Лускаті і листуваті, слюдоподібні зернисті і землисті маси; рідко кристали. Сингонія моноклінна. Колір золотисто-жовтий до лимонно-жовтого. Риска така ж, як і колір, але світліша. Блиск перламутровий, сильний. Спайність цілком досконала. Листочки гнучкі, але не пружні. Твердість 1,5-2.
Реальгар AsS	Зернисті і землисті агрегати, нальоти, кірки, друзи із дрібних коротко-призматичних кристалів. Сингонія моноклінна. Колір оранжево-червоний. Риска світло-оранжева. Блиск алмазний на гранях кристалів. Спайність середня. Злом напівраковистий. Твердість 1,5-2. Ріжеться ножом.
Галіт NaCl	Найчастіше суцільні, щільні зернисті маси, суцільні пласти; рідше кірочки, нальоти. Сингонія кубічна. Колір білий, безбарвний, від домішок забарвлюється у світлі кольори: сірий, синюватий, червонуватий. Блиск скляний. Спайність досконала по кубу. Розколюється на кубики. Злом раковистий. Твердість близько 2. Розчиняється у воді, має солоний смак.
Сильвін KCl	Зернисті і суцільні маси. Сингонія кубічна. Колір білий, безбарвний, яскраво-червоний, рожевий від домішок лусок гематиту. Блиск скляний. Спайність цілком досконала по кубу. Злом нерівний. Твердість 2. Розчиняється у воді, має гірко-солоний смак.
Карналіт KCl·MgCl ₂ ·6H ₂ O	Суцільні зернисті маси. Сингонія ромбічна. Колір білий, рожевий, червоний. Блиск на свіжому зломі скляний, на повітрі швидко тьмяніє і стає жирним. Спайність відсутня. Злом раковистий. Твердість 2,5. Легко розчиняється у воді; на свіжому повітрі розпливається; має гіркий смак.
Мірабіліт (глауберова сіль) Na ₂ SO ₄ ·10H ₂ O	Суцільні зернисті маси, нальоти, кірочки. Сингонія моноклінна. Колір безбарвний, білий. Блиск скляний. Спайність досконала в одному напрямі. Злом раковистий. Твердість 1,5-2. Легко розчиняється у воді; на свіжому повітрі розпливається; має гірко-солоний смак; при температурі вищою 32° С перетворюється на рідину.
Гіпс CaSO ₄ ·2H ₂ O	Кристали тонко- і товстоплитчасті, дуже великі. Іноді двійники, що нагадують "хвіст ластівки", друзи. Суцільний зернистий, щільний, землистий, з матовим блиском різновид – алебастр . Волокнистий із шовковистим блиском різновид – селеніт . Сингонія моноклінна. Колір білий, іноді жовтий або з рожевим відтінком (від домішок). Риска біла. Блиск скляний, у волокнистих різновидів шовковистий. Спайність цілком досконала. Листочки гнучкі, але не пружні. Твердість 2.
Кіновар HgS	Зернисті, щільні і землисті маси; нальоти, примазки. Кристали рідкісні. Сингонія тригональна. Колір яскраво-червоний, темно-червоний до чорного. Риска червона, багряна. Блиск алмазний, металовидний. Спайність досконала. Злом нерівний. Твердість 2-2,5. Важка, густина 8.
II група. Мінерали середньої твердості (з твердістю від 2,5 до 5)	
<i>А. Мінерали з металічним блиском</i>	
Галеніт	Суцільні зернисті маси. Кристали здебільшого у вигляді кубів, рід-

Назва мінералу і його хімічний склад	Форма агрегатів і найважливіші фізичні властивості
(свинцевий блиск) PbS	ше октаедри і ромбододекаедри в складних комбінаціях. Сингонія кубічна. Колір свинцево-сірий, синюватий, червонуватий. Риска сірувато-чорна. Спайність досконала по кубу. Злом дрібноступінчастий. Твердість 2-3. Важкий, густина 7,5. Плавиться в полум'ї свічки.
Золото самородне Au	Дендрити, листочки, лусочки, зерна і самородки в розсипищах. Рідко октаедри, додекаедри, куби. Сингонія кубічна. Колір золотисто-жовтий. Риска золотисто-жовта з металічним блиском. Спайність відсутня. Злом гачкуватий. Твердість 2,5-3. Важке, густина 19,3; ковке і тягуче.
Мідь самородна Cu	Пластинки, дендрити, самородки. Сингонія кубічна. Колір мідно-червоний, коричневий, світло-рожевий на свіжому зломі. Риска мідно-червона, металічно блискуча. Спайність відсутня. Злом гачкуватий, занозистий. Твердість 2,5-3. Важка, густина 8,9; ковка і тягуча.
Срібло самородне Ag	Дендрити, тонкі пластинки, дротики. Сингонія кубічна. Колір сріблясто-білий. Риска сріблясто-біла. Спайність відсутня. Злом гачкуватий. Твердість 2,5-3. Важке, густина 10-11; ковке.
Куприт Cu ₂ O	Найчастіше суцільні зернисті маси. Кристали дрібні, октаедри, рідше куби. Сингонія кубічна. Колір червоний різних відтінків. Риска червона. Блиск алмазний або напівметалічний. Спайність середня по октаедру. Злом раковистий, нерівний. Твердість 3,5-4.
Халькопірит (мідний колчедан) CuFeS ₂	Суцільні і щільні зернисті маси; кристали рідкісні. Сингонія тетрагональна. Колір латунно-жовтий. Мінерал часто вкритий строкатою побіжалістю. Риска чорна із зеленуватим відтінком. Спайність недосконала. Злом раковистий до нерівного. Твердість 3,5-4.
Піротин (магнітний колчедан) FeS	Суцільні дрібнозернисті маси, вкраплення у вигляді зерен неправильної форми; кристали рідкісні. Сингонія гексагональна. Колір бронзово-жовтий з характерною бурою побіжалістю. Риска сірувато-чорна. Спайність недосконала. Злом нерівний до напівраковистого. Твердість 3,5-4,5. Магнітний.
Платина самородна Pt	Неправильні зерна, самородки. Сингонія кубічна. Колір світлий сталево-сірий. Риска світла сталево-сіра. Спайність відсутня. Злом гачкуватий, нерівний. Твердість 4-4,5. Важка, густина 15-19; ковка.
<i>Б. Мінерали без металічного блиску</i>	
Біотит K(Mg,Fe) ₃ (OH,F) ₂ × ×[AlSi ₃ O ₁₀]	Скупчення лусок, табличок, призматичних кристалів. Сингонія моноклінна. Колір чорний або чорно-бурий. Риска біла. Блиск скляний. Спайність цілком досконала в одному напрямі. Розщеплюється на тонкі, пружні й гнучкі листочки. Твердість 2-3.
Мусковіт KAl ₂ (OH,F) ₂ × ×[AlSi ₃ O ₁₀]	Суцільні дрібнолускаті агрегати, неправильної форми, шестигранні або ромбовидні пластинки. Сингонія моноклінна. Колір сріблясто-білий, світло-жовтий, світло-коричневий, іноді безбарвний. Прозорий. Риска біла. Блиск скляний. Спайність цілком досконала в одному напрямі. Твердість 2-3.
Глауконіт (K,Na,Ca)(Al,Fe ³⁺ ,× ×Fe ²⁺ ,Mg) ₂ (OH) ₂ × ×[Al _{0,35} Si _{3,65} O ₁₀]	Округлі зернини розміром 1-5 мм, вкраплення в піщано-глинистих або глинисто-карбонатних породах; часто служить цементом у пісковиках. Сингонія моноклінна. Колір від яскраво-зеленого до темно-зеленого. Риска зелена. Блиск найчастіше матовий, у щільних різновидах – скляний або жирний. Спайність відсутня, цілком досконала встановлюється лише у великих форм. Злом нерівний. Твердість 2-3.
Кальцит (вапняковий шпат) CaCO ₃	Кристалічно-зернисті (у мармурах, вапняках) та землісті (у крейди) агрегати; скупчення скелетів і черепашок організмів; сталактити і

Назва мінералу і його хімічний склад	Форма агрегатів і найважливіші фізичні властивості
	сталагміти, ооліти; кристали ромбоедри, скаленоедри та ін. Сингонія тригональна. Колір безбарвний або білий, завдяки домішкам може бути забарвлений у різні світлі тони (рожевий, голубий, жовтий та ін.). Риска біла. Блиск скляний. Спайність досконала в трьох напрямках, що відповідають граням ромбоедра. Твердість 3. Закипає при дії розбавленої HCl. Прозорий різновид – ісландський шпат подвоює лінії.
Арагоніт CaCO ₃	Радіально-променисті, волокнисті, зірчасті агрегати, кристалічні кірки, натічні форми, ооліти. Сингонія ромбічна. Колір білий, жовтуватий, сірий. Риска біла. Блиск скляний. Спайність майже відсутня. Злом раковистий. Твердість 3,5-4. Закипає при дії розбавленої HCl. Перламутр і перли – різновиди, що складаються із тоненьких паралельних шарів арагоніту у черепашок молюсків.
Барит (важкий шпат) BaSO ₄	Кристали, щітки, зернисті та листуваті агрегати. Сингонія ромбічна. Безбарвний, білий, голубувато-сірий, зеленуватий, червоний, жовтий. Риска біла. Блиск скляний. Спайність досконала в трьох напрямках. Твердість 3-3,5. Важкий, густина 4,5.
Ангідрит CaSO ₄	Дрібнозернисті, суцільні агрегати; кристали рідкісні. Сингонія ромбічна. Колір білий, голубуватий, сірий, зеленуватий, червоний, жовтий. Риска біла. Блиск в одних напрямках скляний, в інших перламутровий. Спайність досконала. Злом нерівний до занозистого. Твердість 3,5.
Сфалерит (цинкова обманка) ZnS	Кристали і щільні зернисті маси. Сингонія кубічна. Колір жовтий, бурий, темно-бурий до чорного. Риска від жовтої до бурої або бурувато-чорна. Блиск алмазний до металовидного. Спайність досконала по ромбододакедру. Злом раковистий. Твердість 3,5-4. Крихкий.
Малахіт CuCO ₃ ·Cu(OH) ₂	Кірочки, примазки і землісті маси; натічні форми. Сингонія моноклінна. Колір смарагдово-зелений. Риска блідо-зелена. Блиск матовий, скляний, у волокнистих агрегатів шовковистий. Спайність середня. Злом нерівний. Твердість 3,5-4. Закипає при дії розбавленої HCl.
Сидерит FeCO ₃	Зернисті агрегати, іноді кулясті конкреції радіально-променевої будови; землісті маси, натічні й оолітові форми. Кристали – ромбоедри. Сингонія тригональна. Колір сірий, горохово-жовтий, бурувато-жовтий, бурий. Риска біла або жовтувата. Блиск скляний. Спайність досконала по ромбоедру. Твердість 3,5-4,5. Інтенсивно розчиняється в гарячій HCl. Крапля кислоти на сидериті жовтіє від утворення FeCl ₃ .
Азурит 2CuOCO ₃ Cu(OH) ₂	Нальоти, землісті маси; дрібні кристали стовбчастого або таблитчастого обліку, друзи; нальоти. Сингонія моноклінна. Колір темно-синій, в землістих масах голубий. Риска голуба. Блиск скляний, в землістих різновидів матовий. Спайність в трьох напрямках: в одному – досконала, в двох інших – недосконала або відсутня. Злом раковистий. Твердість 3,5-4. Закипає в HCl.
Доломіт CaMg(CO ₃) ₂	Кристалічно-зернисті, щільні або землісті маси; кристали рідкісні. Сингонія тригональна. Колір сірувато-білий, іноді з жовтим, буруватим або зеленуватим відтінком. Риска біла. Блиск скляний. Спайність досконала в трьох напрямках (по ромбоедру). Твердість 3,5-4. Холодна HCl діє на доломіт дуже слабо.
Магнезит MgCO ₃	Грубозернисті агрегати. Ромбоедричні кристали рідкісні. Сингонія тригональна. Колір білий, сірий, жовтий. Риска біла. Блиск скляний.

Назва мінералу і його хімічний склад	Форма агрегатів і найважливіші фізичні властивості
	Спайність досконала по ромбоєдру. Злом раковистий. Твердість 3,5-4,5. Закипає від дії нагрітої HCl.
Флюорит (плавиковий шпат) CaF ₂	Суцільні зернисті агрегати, вкраплення; кристали у вигляді кубів і октаєдрів, друзи. Сингонія кубічна. Колір фіолетовий, зелений, жовтий, фіолетово-чорний, голубий та ін. Часто спостерігається різне забарвлення в різних частинах зразка. Риска біла. Блиск скляний. Спайність досконала по октаєдру. Злом нерівний. Твердість 4.
Серпентин Mg ₆ [Si ₄ O ₁₀](OH) ₈	Суцільні щільні маси тонколускуватої або волокнистої будови. Сингонія моноклінна. Колір від світло- до темно-зеленого. Риска біла або зеленувата. Блиск скляний, жирний, восковий, шовковистий. Злом нерівний, занозистий. Твердість 2,5-4. Волокнистий різновид – хризотил-азбест має шовковистий блиск, легко розщеплюється на тонкі волокна, що схожі на льон ("гірський льон"); утворює жили і прожилки у серпентині.
Апатит Ca ₅ [PO ₄] ₃ (Cl,F,OH)	Зернисті цукровидні маси; дрібні й великі кристали – комбінації гексагональної призми та дипіраміди. Сингонія гексагональна. Колір зелений, жовтий, білий, фіолетовий, бурий або безбарвний. Риска біла. Блиск скляний на гранях і жирний на поверхнях злому. Спайність недосконала. Злом нерівний, раковистий. Твердість 5.
III група. Мінерали тверді (з твердістю від 5 до 7)	
<i>А. Мінерали з металічним блиском</i>	
Гематит (червоний залізняк) Fe ₂ O ₃	Дрібно- і прихованокристалічні агрегати, землісті, лускаті, листуваті, натічні та ін. утворення. Сингонія тригональна. Колір від червоно-бурого до залізо-чорного. Риска вишнево-червона, червоно-коричнева. Блиск металовидний. Спайність відсутня. Злом напівраковистий до нерівного. Твердість 5-6.
Ільменіт (титанистий залізняк) FeTiO ₃	Вкраплені в породу зерна неправильної форми, рідше суцільні дрібнозернисті агрегати; кристали товстотаблитчасті, пластинчасті. Сингонія тригональна. Колір залізо-чорний. Риска чорна, іноді бура. Блиск металічний або металовидний. Спайність відсутня. Злом раковистий. Твердість 5-6. Слабкомагнітний.
Магнетит (магнітний залізняк) Fe ²⁺ Fe ³⁺ O ₄	Суцільні маси або зерна в різних породах; іноді октаєдричні кристали та їх друзи. Сингонія кубічна. Колір залізо-чорний. Риска чорна. Блиск металічний або напівметалічний. Спайність відсутня. Злом нерівний. Твердість 5,5-6,5. Дуже магнітний.
Хроміт FeCr ₂ O ₄	Часто вкраплення в ультраосновних породах (округлі зерна, суцільні зернисті маси), рідше дрібні октаєдричні кристали. Сингонія кубічна. Колір залізо-чорний. Риска темно-бура. Блиск металовидний. Спайність відсутня. Злом нерівний. Твердість 5,5.
Пірит (сірчаний або залізний колчедан) FeS ₂	Щільні дрібнокристалічні маси, вкраплення; кристали – куби або пентагондодекаєдри. Сингонія кубічна. Колір латунно-жовтий. Риска чорна. Спайність відсутня. Злом нерівний. Твердість 6-6,5.
Марказит (променистий колчедан) FeS ₂	Променисті, зубчасті та гребінчасті зростки, нирковидні та натічні форми, конкреції, суцільні зернисті маси; кристали таблитчасті або списовидні. Сингонія ромбічна. Колір латунно-жовтий, із сіруватим або зеленуватим відтінком. Риска чорна. Спайність недосконала. Злом нерівний. Твердість 6-6,5.
Арсенопірит (миш'яковий колчедан)	Зірчасті зростки, суцільні зернисті маси; кристали призматичного обліку. Сингонія моноклінна. Колір сріблясто- або олов'яно-білий, на зломі сталево-сірий. Риска сірувато-чорна. Спайність доскона-

Назва мінералу і його хімічний склад	Форма агрегатів і найважливіші фізичні властивості
FeAsS	ла. Злом нерівний. Твердість 5,5-6. При ударі молотком або при терті пахне часником.
Каситерит (олов'яний камінь) SnO ₂	Вкраплення, рідше – суцільні зернисті маси, радіально-волокнисті агрегати і натічні форми; кристали призматичного обліку. Сингонія тетрагональна. Колір жовтий, темно-бурий до смоляно-чорного. Риска світло-коричнева. Блиск металовидний або алмазний. Спайність недосконала. Злом нерівний. Твердість 5-6. Крихкий; важкий, густина 7,5-10,6.
Уранініт UO ₂	Натічні форми, дендритоподібні виділення, дрібні кульки, плівки, сажисті нальоти, порошкоподібні маси; кристали рідкісні. Сингонія кубічна. Колір смоляно-чорний. Риска чорна, бурувато-чорна. Блиск смолистий, на гранях металовидний. Спайність відсутня. Злом раковистий, нерівний. Твердість 6-7. Крихкий; важкий, густина 6,8-7,0; дуже радіоактивний.
<i>Б. Мінерали без металічного блиску</i>	
Лімоніт mFe ₂ O ₃ ·nH ₂ O	Натічні форми, ооліти, конкреції, щільні, пористі, порошкоподібні маси. Аморфний. Колір коричневий та іржаво-бурий різних відтінків. Риска жовтувато-бура до червонуватої. Блиск матовий. Спайність відсутня. Злом раковистий до нерівного і землистого. Твердість 1-5; землісті і вохристі різновиди мають меншу твердість. При нагріванні у закритій трубці виділяється багато H ₂ O.
Опал SiO ₂ ·nH ₂ O	Натічні форми, мучнисті, порошкоподібні, пористі маси, кірочки, плівки, прожилки, ооліти, псевдоморфози по залишках рослин і тварин. Аморфний. Колір мінливий (в залежності від домішок) від безбарвного чи білого до жовтого, оранжевого, зеленого, чорного та ін.; іноді гарна гра кольорів (у благородного опала). Риска біла, у кольорових різновидів – слабкозабарвлена. Блиск матовий, восковий, скляний до смолистого. Злом раковистий або нерівний. Твердість 5-6,5.
Ортоклаз Калі-натровий польовий шпат (K,Na)[AlSi ₃ O ₈]	Суцільні зернисті, агрегати, вкраплення, рідше призматичні чи таблитчасті кристали, друзи, двійники. Сингонія моноклінна. Колір білий, сірий, світло-жовтий, блідо-рожевий, м'ясо-червоний, червоний. Риска не дає, вивітрені зразки дають білу риску. Блиск скляний. Спайність досконала в двох напрямках під прямим кутом. Твердість 6. Відрізнити ортоклаз від мікрокліна без точних оптичних досліджень неможливо.
Мікроклін Калі-натровий польовий шпат (K,Na)[AlSi ₃ O ₈]	Суцільні зернисті, агрегати; кристали й друзи зустрічаються рідко і за зовнішнім виглядом нагадують ортоклаз. Сингонія триклінна. Колір білий, сірий, світло-жовтий, блідо-рожевий, м'ясо-червоний, червоний, зелений (амазоніт). Риска не дає, вивітрені зразки дають білу риску. Блиск скляний. Спайність досконала в двох напрямках під кутом, що відрізняється від прямого на 20'. Твердість 6. Відрізнити мікроклін від ортоклазу без точних оптичних досліджень неможливо.
Лабрадор Вапняково-натровий плагіоклаз. Ізоморфна суміш альбіту (50-70%) та анортиту (50-30%)	Суцільні грубозернисті агрегати; кристали зустрічаються рідко. Сингонія триклінна. Колір темно-сірий, зеленувато-сірий; характерні сині відблиски на площинах спайності (іризація). Риска не дає. Блиск скляний. Спайність досконала в двох напрямках. Злом нерівний, східчастий. Твердість 6-6,5.
Альбіт Натровий плагіоклаз Na[AlSi ₃ O ₈]	Суцільні грубо зернисті агрегати, вкраплення; друзи й кристали в пегматитах. Сингонія триклінна. Колір білий. Блиск скляний. Спайність досконала в двох напрямках. Твердість 6-6,5.

Назва мінералу і його хімічний склад	Форма агрегатів і найважливіші фізичні властивості
Анортит Кальцієвий плагіоклаз $\text{Ca}[\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8]$	Дрібні кристали в основних магматичних породах. Сингонія триклінна. Колір сірий, білий або жовтуватий. Блиск скляний. Спайність досконала в двох напрямках. Твердість 6-6,5.
Нефелін $\text{Na}[\text{AlSi}_3\text{O}_8]$	Суцільні щільні, зернисті маси, вкраплення в породі; дрібні призматичного обліку кристали трапляються рідко. Сингонія гексагональна. Колір сірий із зеленуватим, буруватим чи червонуватим відтінком. Риски не дає. Блиск жирний на зломі, скляний на гранях кристалів. Спайність відсутня або недосконала. Злом плоскораковистий. Твердість 5-6.
Рогова обманка $\text{Ca}_2\text{Na}(\text{Mg}, \text{Fe}^{2+})_4 \times [(\text{Si}, \text{Al})_4\text{O}_{11}]_2(\text{OH})_2$	Видовжені, призматичні, плоскі кристали і суцільні маси голчастої або призматичної будови. Сингонія моноклінна. Колір сіро-зелений, темно-зелений, чорний. Риска сіра, зеленувато-сіра. Блиск скляний або матовий. Спайність досконала по призмі. Злом занозистий. Твердість 5,5-6.
Актиноліт $\text{Ca}_2(\text{Mg}, \text{Fe})_5 \times [(\text{Si}_4\text{O}_{11})_2(\text{OH})_2]$	Суцільні голчастої будови маси; волокнисті і щільні агрегати. Сингонія моноклінна. Колір світло-зелений до темно-зеленого. Риска біла, зеленувато-біла. Блиск скляний, шовковистий. Спайність досконала по призмі. Злом занозистий. Твердість 5-6. Крихкий; щільний, прихованокристалічний різновид – нефрит .
Родоніт $\text{CaMn}_4[\text{Si}_5\text{O}_{15}]$	Суцільний, дрібнозернистий, щільний; кристали рідкісні. Сингонія триклінна. Колір рожевий, бурувато-червоний, малиновий з чорними прожилками і плямами окислів марганцю. Риски не дає. Блиск скляний. Спайність досконала. Твердість 5,5-6,5.
Дистен (кіаніт) $\text{Al}_2\text{O}[\text{Si}_2\text{O}_7]$	Витягнуті, пластинчасті кристали або їх радіально-променисті зростки. Сингонія триклінна. Колір голубий (до білого), синій, сірий до чорного, рідше зелений, бурий, жовтий. Блиск скляний. Спайність досконала. Злом нерівний. Анізотропний за твердістю: на площині спайності по довжині кристалу 4,5, поздовж – 6.
Халцедон SiO_2	Щільні маси, натічні утворення, секреції, прожилки, кірки, псевдоморфози по інших мінералах та органічних залишках. Прихованокристалічний різновид кварцу. Колір дуже різноманітний: голубувато-сірий і синій (сапфірин), червоний, рожевий, блідо-рожевий (сердолік), бурий (сардер), зелений (плазма), яблучно-зелений (хризопраз), зелений із яскраво-червоними плямками (геліотроп), концентрично- (агат) й лінійно-смугастий (онікс). Риски не дає. Блиск восковий, матовий. Спайність відсутня. Злом раковистий; розколюється, утворюючи гострі краї. Твердість 6,5-7.
Олівін (перидот) $(\text{Mg}, \text{Fe})_2\text{SiO}_4$	Суцільні зернисті агрегати або вкраплені зерна; кристали рідкісні. Сингонія ромбічна. Колір оливково-зелений, жовто-зелений, буруватий до чорного; прозорий різновид – хризоліт . Риски не дає. Блиск скляний або жирний. Спайність недосконала. Злом нерівний до раковистого. Твердість 6,5-7.
Епідот $\text{Ca}_2(\text{Al}, \text{Fe})_3[\text{Si}_2\text{O}_7]_2\text{O}(\text{OH})$	Суцільні зернисті та променисті агрегати; кристали видовжено-призматичні з грубою штриховкою. Сингонія моноклінна. Колір зелений різних відтінків. Риска біла до сірої. Блиск скляний, смолистий. Спайність досконала. Злом раковистий, нерівний. Твердість 6-7.
IV група. Мінерали дуже тверді (з твердістю більше 7)	
<i>Мінерали без металічного блиску</i>	
Кварц SiO_2	Суцільні зернисті маси; кристали видовжено-призматичної форми із пірамідальними закінченнями, друзи. Сингонія тригональна. Ко-

Назва мінералу і його хімічний склад	Форма агрегатів і найважливіші фізичні властивості
	лір дуже різноманітний: безбарвний і прозорий (гірський криштал), молочно-білий (молочний кварц), світло-бурий або світло-сірий (раухтопаз), чорний (моріон), фіолетовий (аметист), лимонно-жовтий (цитрин) та ін. Риски не дає. Блиск скляний, в суцільних масах іноді жирний. Спайність відсутня. Злом нерівний, раковистий. Твердість 7.
Альмандин Група граната $Fe_3Al_2[SiO_4]_3$	Суцільні зернисті маси; кристали – ізометричні ромбододекаедри. Сингонія кубічна. Колір коричнево- або фіолетово-червоний майже до чорного. Риски не дає. Блиск скляний, на зломі жирний. Спайність недосконала. Злом раковистий, нерівний. Твердість 6,5-7,5.
Циркон $ZrSiO_4$	Добре огранені кристали у формі тетрагональних призм із пірамідальними голівками. Сингонія тетрагональна. Колір золотистий, жовтий, червоно-бурий, темно-коричневий. Риски не дає. Блиск скляний до алмазного, іноді жирний. Спайність недосконала по призмі. Злом нерівний, раковистий. Твердість 7,5-8.
Топаз $Al_2[SiO_4](OH,F)_2$	Друзи, дрібнозернисті маси; кристали призматичного обліку. Сингонія ромбічна. Колір жовтий, димчастий, голубий, рожевий, часто безбарвний. Риски не дає. Блиск скляний. Спайність досконала в одному напрямку. Злом нерівний. Твердість 8.
Турмалин $(Na,Ca)R_3(Al,Fe^{3+})_4 \times [Si_6O_{18}][BO_3]_3 \times (O,OH,F)_4$ R=Mg,Fe ²⁺ ,Mn,Li	Радіально-променисті, голчасті і зернисті агрегати; кристали видовжені стовбчасті з грубою поздовжньою штриховкою. Сингонія тригональна. Колір рожевий, червоний, зелений, жовтий, чорний, бурий; поліхромний. Риски не дає. Блиск скляний; світлозabarвлені різновиди прозорі. Спайність недосконала. Злом нерівний. Твердість 7.
Берил $Al_2Be_3[Si_6O_{18}]$	Кристали у вигляді гексагональних призм; друзи. Сингонія гексагональна. Колір блідо-зелений, яскраво-зелений, трав'янисто-зелений (смарagd), синювато-голубий (аквамарин), рожевий, іноді безбарвний. Риски не дає. Блиск скляний. Спайність недосконала. Злом нерівний, часто раковистий. Твердість 7,5-8.
Корунд Al_2O_3	Вкраплення або дрібнозернисті скупчення; кристали двох типів: витягнуті та приплюснуті. Сингонія тригональна. Колір синювато- або жовтувато-сірий; червоний (рубін), синій (сапфір) та інші прозорі різновиди. Риски не дає. Блиск скляний. Спайність відсутня. Злом нерівний. Твердість 9.
Алмаз C	Кристали октаедри; радіально-променисті кульки, щільні чорні або буруваті маси. Сингонія кубічна. Колір білий, голубий, зелений, жовтувато-коричневий, чорний, безбарвний. Риски не дає. Блиск алмазний. Прозорий. Спайність середня по октаедру. Злом раковистий. Твердість 10.

Контрольні питання

1. Визначення понять “мінерал” та “гірська порода”. Поширення мінералів у природі.
2. Аморфні і кристалічні речовини.
3. Симетрія кристалів. Сингонії.
4. Форми знаходження мінералів у природі.
5. Колір, риска і блиск.
6. Злом, спайність і твердість.
7. Визначення мінералів за зовнішніми ознаками.
8. Методи визначення і дослідження мінералів:

9. Класифікації мінералів.
10. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу самородні елементи.
11. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу сульфідів.
12. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу галоїдні сполуки.
13. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу оксиди та гідрооксиди.
14. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу карбонати.
15. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класів сульфати та фосфати.
16. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу силікати.
17. Власне магматичний процес ендегенного мінералоутворення.
18. Пегматитовий процес ендегенного мінералоутворення.
19. Пневматоліто-гідротермальний процес ендегенного мінералоутворення.
20. Породоутворюючі й акцесорні мінерали. Парагенезис мінералів.

Література: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 19.

Модуль II. ТЕМА 3

Магматичні породи

ЗАВДАННЯ. Користуючись таблицею 6, визначити і описати магматичні гірські породи із роздаткового набору. Опис порід оформити за зразком таблиці 5.

Таблиця 5. Опис магматичних порід

Назва породи	Структура і текстура	Умови утворення	Група за вмістом SiO ₂	Мінеральний склад

Список порід

Андезит	Діабаз	Лабрадорит	Пемза	Трахіт
Базальт	Діорит	Ліпарит	Перідотит	
Габро	Дуніт	Обсидіан	Піроксеніт	
Граніт	Кварцовий порфір	Пегматит	Сієніт	

Таблиця 6. Визначник магматичних порід

Вміст SiO ₂ (%)	Інфузивні	Ефузивні		Колір	Структура	Породоутворюючі мінерали	
		кайно-типні	палео-типні			світлі	темні
>65 (кислі)	Граніт			Сірий, рожевий	Зерниста, порфіровидна (рапаківі), пегматитова (пегматит)	Кварц, польовий шпат (калієвий, плагіоклаз)	Біотит, мусковіт, рогова обманка
		Ліпарит		Світло-сірий, червонуватий, жовтуватий	Порфірова, склувата (обсидіан)*, пориста (пемза)*	Кварц, польовий шпат	Біотит, мусковіт, рогова обманка
			Кварцовий порфір	Бурий, червонуватий, сірий	Порфірова	Такі ж, як і в ліпариту, але первинні мінерали зазнали змін	

Вміст SiO ₂ (%)	Інтрुзивні	Ефузивні		Колір	Структура	Породоутворюючі мінерали	
		кайно-типні	палео-типні			світлі	темні
65-52 (середні) з калієвим польовим шпатом	Сієніт			Світло-сірий	Середньозерниста	Мікроклін, ортоклаз, дуже рідко кварц	Рогова обманка рідше біотит
		Трахіт		Білий, жовтуватий, буруватий	Порфірова	Мікроклін, ортоклаз	Рогова обманка, біотит
			Ортофір	Бурий, бурувато-зелений	Порфірова	Такі ж, як і в трахіту, але первинні мінерали зазнали змін	
65-52 (середні) з плагіоклазом	Діорит			Сірий, темно-сірий	Дрібнозерниста	Середній плагіоклаз, рідше кварц, калієвий польовий шпат	Рогова обманка, піроксен, біотит
		Андезит		Темно-сірий, сірий	Порфірова	Середній плагіоклаз	Авгіт, рідше рогова обманка, біотит
			Порфірит	Темно-сірий, темно-зелений	Порфірова	Такі ж, як і в андезиту, але первинні мінерали зазнали змін	
52-45 (основні)	Габро			Темно-сірий, темно-зелений	Середньо- і крупнозерниста	Основний плагіоклаз, лабрадор (лабрадорит)	Авгіт, рідше олівін, рогова обманка
		Базальт		Темно-сірий	Щільна або дрібнозерниста	Основний плагіоклаз	Авгіт, рідше олівін
			Діабаз	Темно-зелений	Порфірова	Основний плагіоклаз	Авгіт, вторинні мінерали
<45 (ультраосновні)	Перидотит	Зустрічаються дуже рідко		Темно-зелений, темно-сірий, чорний	Дрібно-, середньо- і крупнозерниста	Відсутні	Олівін і піроксен
	Піроксеніт						Піроксен
	Дуніт						Олівін
Лужні породи з вмістом SiO ₂ 40-50%	Нефеліновий сієніт			Сірий, рожевий	Крупнозерниста, пегматоїдна	Калієвий польовий шпат, нефелін	Лужні амфіболи і піроксени
		Фоноліт		Сірий	Щільна, характерна тонкоплитчаста окремість	Нефелін, санідін	Лужні амфіболи і лужні піроксени

* Породи перехідного складу, який можна встановити лише за допомогою спеціальних досліджень.

Контрольні питання

1. Ендодинамічні процеси. Магматизм. Виникнення магматичних осередків. Рух магми. Склад магми.
2. Продукти вулканічних вивержень.
3. Типи вулканічних вивержень.
4. Поствулканічні явища. Закономірності географічного поширення вулканів.
5. Загальна характеристика ефузивних порід.
6. Інтрुзивний магматизм. Форми глибинних інтрузій.
7. Класифікація магматичних порід. Структура і текстура магматичних порід як показник умов їх утворення.

Література: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19.

Осадові породи

ЗАВДАННЯ. Користуючись нижче наведеним визначником, визначити і описати осадові гірські породи із роздаткового набору. Опис порід оформити за зразком таблиці 7.

Таблиця 7. Опис осадових порід

Назва породи	Група	Характерні ознаки	Генезис	Практичне значення

Список порід

Брила	Алеврит (лес)	Мергель	Боксит
Валун	Глина монтморилонітова	Доломіт	Фосфорит
Щебінь	Каолін	Діатоміт	Торф
Галька	Глина поліміктова	Опока	Буре вугілля
Жорства	Суглинок	Кремій	Кам'яне вугілля
Гравій	Аргіліт	Яшма	Антрацит
Брекчія	Вулканічний туф	Гіпс	Нафта
Конгломерат	Вапняк оолітовий	Кам'яна сіль	Озокерит
Пісок	Вапняк органогенний	Калійна сіль	Горючі сланці
Пісковик	Крейда	Бурий залізняк	

ВИЗНАЧНИК ОСАДОВИХ ПОРІД

Пірокластичні породи

Утворюються при ефузивному магматизмі за рахунок нагромадження твердих продуктів вулканічних вивержень, до яких часто домішується і нормально-осадовий матеріал. Тому найголовнішими відмітними рисами цих порід є їх уламковий характер, наявність продуктів вулканічних вивержень та матеріалу екзогенного походження. Співвідношення між цими компонентами коливається в дуже широких межах.

Вулканічний туф – одна з найпоширеніших пірокластичних порід. Структура уламкова.

Текстура неоднорідна, нерідко пориста. Більш, ніж на 90% порода складається із несортованих уламків вулканічних порід, скла або пемзи, які зцементовані вулканічним попелом або піском. До 5% об'єму може займати матеріал осадово-хімічного походження (глинисті мінерали, виділення кремнезему, окисли заліза тощо). Колір рожевий, червоний, бузковий, сіро-зелений та ін. Від інших пірокластичних порід відрізняється великим вмістом вулканогенного матеріалу (90-100%), відсутністю відсортованості уламкового матеріалу, погано вираженою верствуваністю, асоціацією з ефузивними породами.

Уламкові породи

Утворюються в результаті механічного вивітрювання інших порід. Продукти механічного руйнування рідко залишаються на місці свого первинного утворення, частіше вони переносяться зовнішніми геологічними агентами (вітром, атмосферними водами, річками, морями, льодовиками тощо) і перевідкладаються. Класифікуються уламкові породи не за хімічним чи мінеральним складом, а за розмірами уламків, їх формою та зцементованістю. Класифікація уламкових порід подано в табл. 8. Визначення крупно- і середньоуламкових порід здебільшого не викликає складнощів. При визначенні і описі цих порід слід також звертати увагу на характер цементу. Цементуючими речовинами можуть бути: вапняк (бурхливо реагує з розбавленою HCl), гіпс (ніготь залишає подряпину), глина (коли поди-

хати, відчувається землистий запах), кварц, халцедон, опал (ніж не залишає подряпини), гідроксиди заліза (надають породі іржаво-бурого чи вохристо-жовтого кольору) та ін.

Таблиця 8. Класифікація уламкових порід

Група порід	Діаметр часток, мм	Пухкі		Зцементовані	
		Необкатані (кутасті)	Обкатані	Необкатані (кутасті)	Обкатані
Крупноуламкові	>100	Брили	Валуни	Брекчії	Конгломерати
	100-10	Щебінь	Галечник		
	10-2	Жорства	Гравій		
Середньоуламкові (піщані)	2-0,1	Піски		Пісковики	
Дрібноуламкові (пилуваті)	0,1-0,01	Алеврити або леси		Алевроліти	
Тонкоуламкові (глинисті)	<0,01	Глини		Аргіліти	

Лес – ущільнені пилуваті частки. Будова землиста, легко розтирається між пальцями в дрібний пил з поодинокими піщинками або без них. Колір жовтувато-сірий (палевий). Складається переважно з кварцових, глинистих та карбонатних часток. Дрібнопористий. При зволоженні зменшується в об'ємі, утворюючи на поверхні землі просадки. При змочуванні водою утворює малопластичну масу, розпадається і не розбухає. Має землистий запах. В природних відслоненнях призводить до утворення крутих прямо-висних стінок (вертикальних окремоостей). Від інших порід легко відрізняється за вказаними вище фізичними властивостями, поведінці з водою, реакцією з HCl. Часто в лесах трапляються фігурні карбонатні жовники, які носять назву журавчиків або (якщо в середині вони порожнисті) “дутиків”. Лесами вкрито майже 80% території України, на яких сформувались родючі ґрунти – чорноземи.

Глинисті породи (глини)

Глинами називають осадові породи, які утворюють при змочуванні їх водою пластичні маси, що після висихання зберігають надану їм форму, а після випалювання набувають твердості каменю. Глинисті породи займають проміжне положення між уламковими і породами хімічного походження, оскільки складаються не лише із дуже дрібно перетертих уламків материнських порід, але й з особливих глинистих мінералів, що утворились при хімічному вивітрювання первинних порід. Нині нараховується близько 60-ти глинистих мінералів, серед яких найпоширенішими є каолініт, монтморилоніт та гідрослюди. В глинистих породах мінеральний склад здебільшого змішаний – поліміктові (полімінеральні) глини. При переважанні в породі того чи іншого глинистого мінералу, глини носять назву каолінітових, монтморилонітових і т. п. Мінеральний склад глинистих порід можна визначити лише приблизно за фізичними властивостями тих мінералів, що їх складають. Точна діагностика можлива із застосуванням оптичних методів, хімічного аналізу, а також шляхом забарвлення породи органічними барвниками, про що можна довідатись у спеціальних керівництвах.

Каолінітова глина (каолін). Складається переважно із каолініту. Грудкувата, слабо зв'язана. На дотик жирна, мастить руки. У зволоженому стані малопластична, не розбухає або майже не розбухає. Колір білий, жовтувато-білий, світло-сірий.

Монтморилонітова глина. Складається переважно із монтморилоніту. Має восковидний вигляд. Злом часто раковистий. У зволоженому стані липка або має м'яку здатність. Колір білий або світло-сірий, з жовтуватим або зеленуватим відтінком.

Поліміктова глина. Складається переважно із гідрослюд та різноманітних домішок. Часто в невеликій кількості входить піщаний матеріал, який відчувається при розтиранні глини між пальцями. В сухому стані землиста, грудкувата, легко розсипається; у зволоженому – липка, пластична. У воді не розбухає, а розпадається на дрібні грудочки й

лусочки. На дотик буває як жирною, так і сухою (пісною). Колір сірий, коричнево-сірий, червонуватий різних відтінків, зеленуватий, голубувато-сірий.

Суглинок. Основні фізичні властивості аналогічні властивостям поліміктових глин. Від них суглинок відрізняється значно більшим вмістом піщаного матеріалу (25-50%), який виявляється візуально або шляхом розтирання породи пальцями. Значна кількість піщинок знижує пластичні властивості суглинку. Це можна дослідити, якщо суглинок змочити водою, зліпити з нього кульку і стиснути її в коржик. При цьому з країв коржика виникнуть тріщинки, а коржик з поліміктової глини буде цільним.

Аргіліт. Склад поліміктовий або переважно гідрослюдястий. Порода каменеподібна, дуже щільна. Твердість середня. Окремості гострокутно-грудкуваті з нерівним, часто раковистим зломом. Трапляються і плитчасті аргіліти, які іноді називають глинистими сланцями. У воді не розмокає. Колір різний, типові темні до чорного тони у зв'язку із домішками вуглистої речовини.

Породи хімічного і біохімічного походження

Породи даної групи виникають головним чином шляхом випадання мінеральної речовини в осадок виключно хімічним шляхом, а також при прямій або опосередкованій участі організмів. Класифікують хемобіогенні породи виходячи із особливостей їх хімічного складу і в меншій мірі враховують умови утворення. У зв'язку з цим виділяють наступні підгрупи порід: 1) карбонатні, 2) кременисті, 3) галоїдні та сульфатні, 4) залізисті та марганцеві, 5) алюмінієві, 6) фосфатні, 7) каустобіоліти. До карбонатних порід відносяться вапняк, мергель, доломіт; до кременистих – діатоміт, опока, кремін, яшма; до галоїдних та сульфатних – гіпс, кам'яна і калійна солі; до залізистих – бурий залізняк; алюмінієвих – боксит; фосфатних – фосфорит; каустобіолітів – торф, буре вугілля, кам'яне вугілля, антрацит, нафта, озокерит, горючі сланці.

Вапняк. Структура дуже різноманітна і служить основою для виділення великої кількості різновидів. Текстура однорідна, шарувата, пориста та ін. Порода складається із кальциту, рідко – арагоніту. Дуже часто присутні різноманітні домішки: доломіт, кремениста речовина, пішаний та глинистий матеріал, бітуми. Підвищення їх вмісту призводить до утворення порід змішаного складу: вапняку доломітового, кременистого, піщаного, мергелю, бітумінозного вапняку і т.п. Колір білий, світло-сірий, рідше темно-сірий до чорного (у зв'язку з присутністю вуглистої речовини або бітуму), жовто-бурий (при наявності окислів заліза), зеленуватий (через наявність глауконіту). Бурхливо взаємодіє з розбавленою HCl. Найголовніші різновиди вапняку: **оолітовий, органігенний, крейда.**

Оолітовий вапняк. Агрегат сферичних або еліпсоїдних оолітів кальциту розміром від долі міліметра до 2-2,5 мм, зцементованих прихованокристалічною карбонатною речовиною (оолітова структура). Ооліти мають концентрично-зональну, рідше радіально-променисту будову, причому в центрі кожного із них розміщується дуже дрібний уламок черепашки, піщинки або зерно кальциту.

Органогенний вапняк має органігенну структуру і складається переважно із цілих черепашок або їх уламків (детриту), які зцементовані карбонатною речовиною. Представниками органігенних вапняків є: *вапняк-черепашник* – легкий, пористий, білий, жовтий або сірий, майже повністю складений великими (0,5-2 см) черепашками молюсків; *кораловий вапняк* – представлений великою різноманітністю залишків фауни, в першу чергу коралами (сноповидні агрегати тонких трубочок з численними поперечними перегородками); *моховатковий вапняк* (колонії із численних комірок розміром до 3 мм, об'єднаних єдиним стовбуром; відбитки мають форму дрібної сітки); *криноїдний вапняк* (від лат. *Crinioidea* – морські лілії) складається із циліндричних члеників – частин колишнього стебла зі слідом осьового каналу в центрі; *нумулітовий вапняк* складається із сплюснутих круглих черепашок древніх форамініфер – нумулітів; *фузуліновий вапняк* складається із форамініфер фузулін, які мають видовжені, веретеновидні черепашки.

Крейда. Землиста, мікрозерниста (розмір зерен менше 0,01 мм), високопориста, білого кольору порода, яка складається із мікроскопічних черепашок золотистих водоростей (коколітофорид), форамініфер, дрібно перетертих уламків черепашок молюсків та інших організмів, а також від 5 до 60 % порошкоподібного кальциту. Від інших вапняків відрізняється тим, що має малу твердість, легко кришиться, мастить пальці і злегка прилипає до язика; від діатоміту відрізняється реакцією з HCl.

Мергель (глинистий вапняк). Структура тонкозерниста (розмір часток менше 0,01 мм). Текстура шарувата, часто тонкошарувата. За складом – однорідна суміш глинистих і карбонатних (кальцит, рідше доломіт) мінералів, що містяться приблизно в однакових пропорціях. Характерна наявність великої кількості викопної фауни. Порода кам'яниста, щільна із низькою або середньою твердістю. Колір білий, світло-сірий, жовтуватий або зеленуватий, рідше темно-сірий або червонуватий. Мергель здебільшого бурхливо взаємодіє з HCl, але на відміну від інших карбонатних порід крапля кислоти після реакції залишає на його поверхні брудну пляму (нерозчинний глинистий залишок).

Доломіт. Структура дуже різноманітна і покладена в основу виділення різновидів доломіту. За текстурою доломіти аналогічні вапнякам. Складається в основному із мінералу доломіту і деяких другорядних компонентів: кальциту, магнезиту, кварцу, халцедону та ін. Порода кам'яниста, міцна. Твердість середня. Колір жовтувато-бурий, сірий, від домішок органічної речовини темно-сірий до чорного. За зовнішнім виглядом часто нагадує деякі вапняки, але відрізняється відсутністю реакції з холодною HCl (з даною кислотою доломіт взаємодіє або в гарячому вигляді, або будучи подрібненим у порошок).

Діатоміт. Порода складається із часток розміром 0,001-0,01 мм. Має землистий облік. Однорідна або шарувата. За складом діатоміт – це зцементовані опалом залишки черепашок діатомових водоростей. Для діатоміту характерна невелика твердість, пористість і легкість. Колір білий, світло-сірий або жовтуватий. Прилипає до язика. За зовнішнім виглядом часто нагадує крейду, але з HCl не взаємодіє.

Опока. Структура тонкозерниста (розмір часток 0,001-0,01 мм). Текстура однорідна, шарувата. Складається із дуже дрібних зерен опалу, частково залишків скелетів водоростей, домішок органічної речовини, глауконіту та ін. Порода кам'яниста, міцна, легка, пориста, прилипає до язика, має середньою твердість. Злом раковистий, уламки з гострими краями. Колір різноманітний; чисті різновиди мають світле забарвлення: сірий, жовтуватий, зеленуватий. Опока може бути схожа до мергелю, глини і діатоміту. Від мергелю відрізняється відсутністю реакції з HCl, від глини – нездатністю розмокати у воді, від діатоміту – характером злому та звуком при розколюванні (при розколюванні діатоміту виникає глухий звук, при розколюванні опоки – дзвінкий).

Кремій. Однорідний або смугастий, дуже щільний агрегат кремнезему – халцедону і кварцу та домішок опалу, гідрооксидів заліза, органічної речовини тощо. Має велику твердість. Злом раковистий. Розколюється на уламки з ріжучими краями. Колір різноманітний: білий і світло-сірий (чистий кремій), коричневий, червонуватий або бурий різної інтенсивності (домішки гідрооксидів заліза), темно-сірий і чорний (домішки органічної речовини). Забарвлення може бути й неоднорідним у вигляді плям та смуг. В тонких сколах кремій нерідко просвічується.

Яшма. Структура прихованокристалічна. Текстура дуже різноманітна: масивна, плямиста, смугаста, брекчієва, плейчаста (складчаста) та ін. Склад – агрегат халцедону і кварцу. Тонко розпилені й нерівномірно розподілені домішки актиноліту, хлориту, слюд, піриту, оксидів та гідрооксидів заліза і марганцю та інших мінералів обумовлюють різноманітність і строкатість забарвлення яшм. Порода кам'яниста, дуже щільна з великою твердістю. Злом рівний або раковистий; скалки гострі з ріжучими краями. Блиск на свіжому зломі матовий. Забарвлення яскраве, як однорідне, так і мінливе в одному шматку. Поширені червоні, червоно-бурі, коричневі, жовті, рожеві, фіолетові, чорні,

зелені, сірі тони. Неоднорідність розподілу забарвлення зумовлює часто складні мережива: плями, струмені, хвилеподібні або ламані смуги з м'якими переходами чи з різкими контурами. В таких строкатих яшмах можна знайти аналоги якихось фантастичних пейзажів – *пейзажні яшми*.

Гіпс. Зерниста, тонковолокниста або землиста порода, яка складається з однойменного мінералу – гіпсу. Характер забарвлення залежить від наявності тих чи інших домішок, але завжди світле: біле, жовтувате, рожеве, зеленувате, сіре тощо. Від макроскопічно схожої породи ангідриту відрізняється меншою твердістю (драпається нігтем).

Кам'яна сіль. Має зернисту структуру й складена мінералом галітом. Як і для мінералу, характерний солоний смак. Чиста кам'яна сіль безбарвна. Домішки (сильвін, глинисті мінерали, органічні рештки, оксиди заліза) можуть надавати їй синього, сірого, червоного або іншого забарвлення.

Калійна сіль. Також має зернисту будову і являє собою мінеральний агрегат сильвіну й галіту (*сильвініт*) або карналіту й галіту (*карналітова порода*). Характерний гірко-солоний смак. Домішками можуть бути ангідрит, глинисті мінерали, гематит. Останній часто зумовлює червоне або буре забарвлення.

Бурий залізняк. Складається з лімоніту та різноманітних домішок (каолініту, кварцу, опалу, фосфору тощо). Має різних відтінків буре забарвлення і часто оолітову будову (*болотні залізні руди*).

Боксит. Має землистий або оолітовий облік і складається з мінералів, які є гідратами оксидів алюмінію (діаспору – AlO_2 , беміту – $\text{AlO}(\text{OH})$, гідраргіліту – $\text{Al}(\text{OH})_3$), а також домішок бурого залізняку, гематиту, глини, карбонатів, опалу та інших порід і мінералів. Порода має характерний цегельно-червоний або бурувато-червоний колір.

Фосфорит. За формою залягання може бути пластовим або конкреційним. Порода аморфна з матовою або блискучою поверхнею. Конкреційні фосфорити мають радіально-променеву будову. Складається в основному із фосфату кальцію та значної частини домішок піщаного чи глинистого матеріалу. Колір темно-сірий, чорний, бурувато-сірий. При терті одного куска фосфориту об інший виникає характерний запах паленої кістки.

Торф. Має вигляд більш-менш ущільненої маси в різній степені розкладених і обвуглених рослинних решток. Рештки слабо зв'язані між собою і тому торф легко ламається на окремі шматки. Структура здебільшого волокниста. В сухому стані дуже легкий. Горючий. Вміст вуглецю – близько 60 %.

Буре вугілля. Відрізняється бурим кольором (від світлого – пухкі різновиди, до досить темного і чорного – щільні різновиди), бурою або бурувато-чорною рисою, матовим або жирним блиском, землистим, рідше напівраковистим зломом, здатністю загоратися від сірника. Складається з гумінових кислот з домішками вуглеводнів та високомолекулярних неуглеводневих сполук вуглецю (карбоїдів). Вміст вуглецю – 67-75 %.

Кам'яне вугілля. Структура аморфна. Текстура смугаста, сланцювата, рідше однорідна. Колір чорний або темно-сірий. Риска чорна. Блиск матовий, шовковистий, смолистий до скляного. Горючий. На відміну від бурого вугілля гумінові кислоти відсутні, вони повністю перетворені в карбоїди. Вміст вуглецю – 80-92 %.

Антрацит. За зовнішнім виглядом істотно відрізняється від інших видів вугілля. Колір чорний зі сталєво-сірим, жовтуватим (золотистим) відтінками. Блиск сильний металічний або металовидний. Злом раковистий, напівраковистий або нерівний. Запалюється погано, горить слабким бездимним полум'ям. Складається з органічних речовин найвищої степені вуглефікації, серед яких розсіяні дрібні графітові частки. Середній вміст вуглецю – 95 %.

Нафта. Масляниста рідина здебільшого чорного кольору. Характерний своєрідний керосиновий запах. Являє собою суміш різних вуглеводнів з невеликим вмістом азотистих, сірчистих сполук та мінеральних домішок.

Озокерит. Має консистенцію твердого тіла або пластичний (воскоподібний). Жирний на дотик. Структура аморфна, текстура однорідна. Колір чорний, бурий до світло-жовтого. Легко плавиться і загоряється. Згоряє без залишку яскравим кіптявим полум'ям. Складається з твердих вуглеводнів переважно парафінового ряду.

Горючий сланець. Структура тонкозерниста (розмір часток менше 0,01 мм). Текстура сланцювата. За структурними ознаками й складом – це мергель або аргіліт, які просякнуті органічними бітумінозними речовинами. Колір світло-каштановий, темно-сірий, чорний. Легко загоряється від сірника, розповсюджуючи характерний запах паленої гуми.

Контрольні питання

1. Генетична класифікація осадових порід. Поширення осадових порід.
2. Верстуватість осадових порід. Причини верстуватості.
3. Хімічний і мінеральний склад осадових порід.
4. Літогенез. Стадії літогенезу. Денудація.
5. Діагенез і катагенез.
6. Загальна характеристика пірокластичних порід.
7. Характеристика теригенних (уламкових) порід.
8. Загальна характеристика і класифікація глинистих порід.
9. Загальна характеристика, генезис і практичне значення карбонатних осадових порід.
10. Загальна характеристика кремнистих осадових порід.
11. Характеристика галоїдних, сульфатних, залізистих і марганцевих осадових порід, їх генезис та практичне значення.
12. Характеристика алюмінієвих та фосфатних порід.
13. Загальна характеристика каустобіолітів, їх генезис. Проблема походження нафти. Практичне значення каустобіолітів.

Література: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19.

ТЕМА 5

Метаморфічні породи

ЗАВДАННЯ. Користуючись таблицею 10, визначити і описати запропоновані осадові гірські породи. Опис порід оформити за зразком таблиці 9.

Таблиця 9. Опис метаморфічних порід

Назва породи	Вихідна порода	Будова (структура)	Забарвлення і особливі ознаки	Мінеральний склад	Тип метаморфізму

Список порід

Гнейс
Грейзен
Джеспіліт (залізистий кварцит)
Кварцит

Мармур
Мігматит
Роговик
Скарн

Сланці:
глинистий,
двохслюдяний,
кристалічний
Чарнокіт

Таблиця 10. Визначник метаморфічних порід

Назва	Мінеральний склад	Структура	Текстура	Інші ознаки
Гнейс	Польові шпати, кварц, рогова обманка, піроксени, біотит, мусковіт	Грано-бластова	Смугаста	Колір сірий або рожевий. Схожий до гранітів, але відрізняється текстурою
Грануліт	Кварц, польовий шпат, гранат	Порфіро-бластова	Смугаста	Колір сірий. Часто містить графіт; піроксени та амфіболи відсутні
Мармур	Кальцит, доломіт	Гомео-бластова	Масивна	Забарвлення різне. Реагує із HCl
Кварцит	Кварц, домішки польового шпату, слюди	Грано-бластова	Масивна або смугаста	Колір сірий або рожевий. Дуже міцний. Мономінеральний склад
Джеспіліт	Кварц, гематит, магнетит	Грано-бластова	Смугаста або плейчаста	Колір темно-червоний. Наявність проверстків гематиту і магнетиту. Магнітність
Амфіболіт	Плагіоклаз, рогова обманка, рідше піроксени, гранати	Грано-бластова	Смугаста або масивна	Колір сірувато-зелений, темно-зелений до чорного
Сланець кристалічний	Кварц, мусковіт, біотит, гранати,	Грано-бластова	Сланцювата	Колір переважно сірий
Сланець двох-слюдяний	Мусковіт, біотит, кварц	Лепідо-бластова	Сланцювата	Колір сірий
Сланець глинистий	Глинисті мінерали, кварц, слюди, часто вуглиста речовина	Лепідо-бластова	Сланцювата	Колір сірий до чорного. Схожий до аргілітів (відрізняється текстурою) та глини (не розмокає у воді)
Сланець тальковий	Тальк, хлорит	Лепідо-бластова	Сланцювата	Колір білий, сірий, зеленуватий. Драпається нігтем
Сланець хлоритовий	Хлорит, тальк, слюда, кварц	Лепідо-бластова	Сланцювата	Колір зелений. М'який. Жирний на дотик
Філіт	Слюди, кварц, польовий шпат	Лепідо-бластова	Сланцювата	Колір зеленуватий, сірий, чорний
Еклогіт	Піроксен, гранат	Гомео-бластова	Масивна	Колір зелений.
Роговик	Слюда, гранат, піроксен, андалузит, кордієрит	Грано-бластова	Масивна	Колір сірий, темно-сірий або бурий. Злом рівний, іноді раковистий
Скарн	Гранат, піроксен, плагіоклаз, карбонати, рудні мінерали, актиноліт	Грано-бластова, гомео-бластова	Смугаста	Забарвлення різне.
Грейзен	Кварц, мусковіт	Гомео-бластова	Масивна	Колір білий або світло-сірий
Лиственіт	Кварц, карбонати, фуксит (зелена слюда)	Гомео-бластова	Масивна	Колір зелений, рідше білий чи світло-жовтий. Взаємне проростання кварцу та карбонату
Серпентиніт	Серпентин, олівін	Фібро-бластова, лепідо-бластова	Смугаста, плямиста	Колір зеленувато-сірий або темно-зелений. Відсутність світлозабарвлених мінералів

Назва	Мінеральний склад	Структура	Текстура	Інші ознаки
Березит	Кварц, серицит (дрібнолускуватий мусковіт), рудні мінерали (пірит)	Грано-бластова	Масивна	Колір світло-сірий і жовтувато-сірий із зеленуватим відтінком. Присутність піриту
Чарнокіт	Гіперстен, кварц, польовий шпат	Грано-бластова	Масивна, грубо-смугаста	Колір темний, голубувато-зелений. Дуже міцний
Мігматит	Польові шпати, кварц, рогова обманка, біотит, рідше піроксени	Грано-бластова	Смугаста, плямиста, плейчаста та ін.	Забарвлення неоднорідне, в сірих тонах від світлих до темних

Контрольні питання

1. Загальна характеристика процесу метаморфізму. Фактори метаморфізму. Класифікація метаморфічних процесів.
2. Характеристика локального метаморфізму. Породи контактового і катакlastичного метаморфізму.
3. Характеристика регіонального метаморфізму. Породи регіонального метаморфізму.
4. Ультраметаморфізм. Породи ультраметаморфізму.
5. Структура і текстура метаморфічних порід. Форми залягання.
6. Хімічний і мінеральний склад метаморфічних порід.

Література: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 19.

ТЕМА 6

Корисні копалини

ЗАВДАННЯ. На контурну карту світу масштабу 1:100 000 000 загальноприйнятими умовними знаками нанести найважливіші родовища корисних копалин магматичного (червоним кольором), осадового (синім кольором) та метаморфічного (чорним кольором) генезису. Назви родовищ винести у легенду карти у відповідності з їх нумерацією.

Перелік родовищ

Магматичний генезис

- Залізні руди: Кірунавара (Швеція), Качканарське, г. Магнітна (Урал).
- Титан: Тегабус (США, шт. Нью-Йорк), родовища Бушвельдського інтрузивного комплексу (ПАР).
- Хром: родовища Великої Дайки (Зімбабве).
- Нікель: родовища р-ну Садбері (Канада, пров. Онтаріо), Нікель (Кольський п-ів), Норільське (Східний Сибір).
- Свинець і цинк (поліметалічні руди): Брокен-Хілл (Східна Австралія), Сулліван (Канада, пров. Британська Колумбія).

- Ртуть: Микитівське (Донбас), Хайдаркен (Киргизстан), Альмаден (Іспанія), Ідрія (Словенія).
- Вольфрам: Сандон (Південна Корея), Клаймакс (США, шт. Колорадо).
- Молібден: Клаймакс (США, шт. Колорадо).
- Золото: родовища р-ну Калгурлі (Західна Австралія), родовища Аляски, Східного Сибіру.
- Платина: родовища Бушвельдського інтрузивного комплексу (ПАР), Великої Дайки (Зімбабве).
- Уран: родовища р-ну Аделаїда (Східна Австралія).
- Апатити: Хібінський р-н (Кольський п-ів).
- Алмази: Кімберлі (ПАР), Мирний (Якутія).

Осадний генезис

- Уран: родовища району Блайнд-Рівер (Канада, пн. побережжя оз. Гурон), Шінко-лобве (Конго).
- Залізні руди: Керченський (Україна), Лотарінгський (Франція) басейни, Бакал (Урал), родовища Південної Якутії, Фредінгем (Великобританія), Зальцгітер (ФРН), Уобана (о. Ньюфаундленд).
- Марганцеві руди: Нікопольське і Великотокмацьке (Україна), Моанда (Габон), Чіатурське (Грузія).
- Мідні руди: родовища рудного поясу Шаба – Колвезі (Замбія, Заір, Конго), Удоканське (Східний Сибір), Джекказганське (Казахстан), родовища Чилі і Перу.
- Боксити (алюмінієві руди): Боке і Туге (Гвінея), Уейп-Тартл-Хед (Австралія, п-ів Кейп-Йорк), Красна Шапочка (Урал), Тихвинське (Європейська частина Росії), боксити Угорщини, Ямайки, Гаїті.
- Золото: золотоносний район Вітватерсранд (ПАР).
- Фосфорити: родовища Марокко, Тунісу, Алжиру, Західної Сахари, Каратау (Казахстан), Маарду (Естонія).
- Калійна сіль: Калушське (Україна), Саскачеванський (Канада, пров. Саскачеван), Верхньокамський (Передуралля) басейни, Старобінське (Білорусь), Стасфуртське (ФРН).
- Кам'яна сіль: Солотвинське, Слов'янське, Сивашське (Україна), Усолля-Сибірське (Прибайкалля), Баскунчак (Поволжя).
- Нафта і газ: Західно- і Східноукраїнська нафтогазоносні провінції, Гхавар (Саудівська Аравія), родовища Кувейту, Ірану, Іраку, Лівії, Венесуели, США (Примексиканська западина), Росії (Західний Сибір, Поволжя, Північний Кавказ, Тімано-Печорська обл.), Туркменістану, Казахстану, Азербайджану.
- Кам'яновугільні басейни: Донецький, Львівсько-Волинський (Україна), Печорський, Кузнецький, Кансько-Ачинський (Росія), Карагандинський, Екібастузький (Казахстан), Верхньосілезький (Польща), Рурський, Саарський (ФРН), Йоркширський (Великобританія), Датунський (Китай), Апалачський, Пенсільванський (США).
- Буровугільні басейни: Дніпровський (Україна), Підмосковний (Росія), Нижньо-рейнський (ФРН).

Метаморфічний генезис

- **Залізні руди:** Криворізький залізорудний басейн, Кременчуцький та Білозерський залізорудні райони (Україна), Курська Магнітна Аномалія (Європейська частина Росії), Ітабіра (Бразилія, шт. Мінас-Жерайс).
- **Графіт:** Завальївське (Україна), Курейське, Ногінське (Східний Сибір), Ботогольське (Саяни), родовища Індії, Мадагаскару, Шрі-Ланки, Південної Кореї.

Контрольні питання

1. Роль магматизму у формуванні родовищ корисних копалин. Найважливіші родовища магматичного генезису.
2. Практичне значення магматичних порід.
3. Осадкові породи як корисні копалини. Найважливіші родовища осадового генезису.
4. Корисні копалини кір вивітрювання.
5. Роль підземних вод в утворенні корисних копалин.
6. Роль метаморфізму в утворенні корисних копалин. Родовища метаморфічного генезису.

Література: 3, 4, 7, 13, 14, 20.

ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ

1. Предмет і завдання геології. Науки геологічного циклу. Зв'язок геології з іншими науками.
2. Методи вивчення внутрішньої будови Землі. Прямі і непрямі методи, їх можливості і недоліки.
3. Земна кора, її будова, товщина, основні типи, хімічний і петрографічний склад.
4. Внутрішня будова Землі. Коротка характеристика внутрішніх геосфер за глибиною, тиском, щільністю, температурою, речовинним складом, агрегатним станом.
5. Хімічний склад Землі. Кларки.
6. Теплове поле Землі. Джерела внутрішнього тепла. Зміна температури з глибиною. Геотермічна ступінь і геотермічний градієнт.
7. Магнітне поле Землі. Пряма і зворотна полярність магнітного поля. Джерело магнітного поля. Магнітометричний метод дослідження земних надр.
8. Визначення понять "мінерал" та "гірська порода". Поширення мінералів у природі.
9. Поняття про аморфні і кристалічні речовини. Властивості кристалічної речовини. Вирощування кристалів у шкільних умовах.
10. Симетрія кристалів і її елементи. Сингонії.
11. Форми знаходження мінералів у природі: друзи, секреції, конкреції, ооліти, сталактити і сталагміти, дендрити тощо.
12. Колір, риска і блиск – важливі діагностичні ознаки мінералів.
13. Злом, спайність і твердість – важливі діагностичні ознаки мінералів.
14. Визначення мінералів за зовнішніми ознаками.
15. Методи визначення і дослідження мінералів: мікроскопічний, електронномікроскопічний, кристалохімічний, рентгеноструктурний, спектральний, хімічний аналіз, метод паяльної трубки та ін.
16. Питання класифікації мінералів. Хімічна класифікація.
17. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу самородні елементи.
18. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу сульфідів.
19. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу галоїдні сполуки.
20. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу оксиди та гідрооксиди.
21. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу карбонати.
22. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класів сульфати та фосфати.

23. Загальна характеристика і практичне значення мінералів класу силікати.
24. Загальна характеристика ендо- і екзодинамічних процесів.
25. Загальна характеристика процесу магматизму. Виникнення магматичних осередків. Рух магми. Склад магми.
26. Загальна характеристика ефузивного магматизму (вулканізму). Будова і морфологія вулканів.
27. Рідкі і тверді продукти вулканічних вивержень. Лави, вулканічний попіл і пісок, лапілі, вулканічні бомби.
28. Загальна характеристика ефузивних і пірокластичних порід: форми залягання, структурні і текстурні особливості, кайнотипні і палеотипні вулканічні породи, головні представники і практичне значення.
29. Газоподібні продукти вулканічних вивержень, їх склад. Фумароли, сольватари і мофети. Мінералоутворення при вулканічних виверженнях.
30. Характеристика тріщинних вулканічних вивержень та кімберлітових трубок (діатрем). Райони поширення. Роль тріщинного вулканізму у формуванні земної кори. Корисні копалини кімберлітових трубок.
31. Вулкани центрального типу (гавайський, стромболіанський, везувіанський, пелейський види) та характер їх вивержень.
32. Характеристика поствулканічних явищ. Райони поширення гейзерів, грязьових вулканів, термальних вод.
33. Закономірності географічного поширення вулканів. Приуроченість вулканів до зон спредингу і субдукції, "гарячих точок", континентальних рифтів.
34. Роль вулканізму у формуванні географічної оболонки.
35. Практичне значення вулканізму: корисні копалини, використання теплової енергії тощо.
36. Загальна характеристика землетрусів. Поняття про осередок землетрусу, гіпоцентр і епіцентр, сейсмічні хвилі, сейсмічні і асейсмічні області. Моретруси і цунамі.
37. Сила і енергія землетрусів. Причини землетрусів. Класифікація землетрусів.
38. Географічне поширення землетрусів. Сейсмічне районування і прогноз землетрусів.
39. Поняття про інтрузивний магматизм. Форми глибинних інтрузій: батоліти, штоки, дайки, лаколіти, лополіти тощо.
40. Власне магматичний процес ендегенного мінералоутворення. Магматична диференціація. Кристалізаційний ряд Боуена. Асиміляція магмою оточуючих порід.
41. Пегматитовий процес ендегенного мінералоутворення.
42. Пневматоліто-гідротермальний процес ендегенного мінералоутворення. Метасоматоз.
43. Пороодоутворюючі і акцесорні мінерали. Парагенезис мінералів.
44. Класифікація магматичних порід за умовами утворення і вмістом кремнезему.
45. Структура і текстура магматичних порід як показник умов їх утворення.
46. Роль магматизму у формуванні родовищ корисних копалин. Найважливіші родовища магматичного генезису.
47. Практичне значення магматичних порід.
48. Загальна характеристика процесу вивітрювання (гіпергенезу). Типи вивітрювання.
49. Фізичне вивітрювання гірських порід. Температурне і механічне вивітрювання. Залежність швидкості вивітрювання від природних умов та мінерального складу порід.
50. Хімічне вивітрювання гірських порід. Характеристика процесів окислення, гідратації та гідролізу.
51. Кора вивітрювання. Типи кір вивітрювання і пов'язані з ними родовища корисних копалин.
52. Характеристика продуктів вивітрювання: елювію, колювію, делювію, пролювію, алювію.
53. Тектонічні рухи земної кори, їх класифікація. Причини тектонічних рухів.
54. Характеристика епейрогенічних (коливних) тектонічних рухів, їх приклади.
55. Характеристика неотектонічних рухів. Сучасні тектонічні рухи.
56. Значення тектонічних рухів у розвитку земної кори та формуванні її структур.
57. Плікативні дислокації, їх види. Елементи залягання верств.
58. Будова і морфологічні типи складок. Діапіри.
59. Розривні порушення, їх морфологія. Види дез'юнктивних дислокацій.
60. Руйнівна, транспортна та акумулювативна робота вітру. Дефляція і коразія. Еолові відклади.

61. Геологічна робота атмосферних вод. Площинна і лінійна ерозія. Яроутворення. Відклади тимчасових водних потоків.
62. Геологічна робота річок. Глибинна і бокова ерозія. Профіль рівноваги. Базис ерозії.
63. Перенесення річками продуктів руйнування гірських порід. Відклади дельт, естуаріїв та лиманів. Алювіальні відклади та їх практичне значення.
64. Загальна характеристика геологічної діяльності підземних вод. Генезис підземних вод.
65. Руйнування гірських порід під дією підземних вод. Карстові процеси. Суфозія.
66. Геологічна діяльність моря. Морська абразія.
67. Фактори, що визначають осадконагромадження в морях: рельєф дна, солоність вод, органічний світ, клімат тощо.
68. Акумулятивна робота морів. Типи морських осадків і їх практичне значення.
69. Геологічна діяльність озер. Відклади озер.
70. Геологічні процеси в болотах. Відклади боліт.
71. Загальна характеристика геологічної діяльності льодовиків. Утворення і рух льодовиків. Типи льодовиків.
72. Руйнівна робота льодовиків. Екзараційні форми рельєфу.
73. Акумулятивна робота льодовиків. Льодовикові відклади.
74. Геологічна діяльність талих льодовикових вод. Флювіогляціалні відклади.
75. Генетична класифікація осадових порід.
76. Верстуватість осадових порід. Причини верстуватості.
77. Хімічний і мінеральний склад осадових порід. Алотігенні та аутігенні мінерали.
78. Поширення осадових порід.
79. Літогенез. Стадії літогенезу. Субаквальні та субаеральні осадки. Денудація.
80. Діагенез, його суть. Характеристика фізико-хімічних процесів, що проходять при діагенезі.
81. Катагенез: фактори, фізико-хімічні процеси, наслідки.
82. Характеристика теригенних (уламкових) порід за формою і розмірами уламків, зцементованістю, мінеральним складом.
83. Загальна характеристика і класифікація глинистих порід.
84. Загальна характеристика, генезис і практичне значення карбонатних осадових порід.
85. Загальна характеристика, генезис і практичне значення кремнистих осадових порід.
86. Характеристика галоїдних, сульфатних, залізистих і марганцевих осадових порід, їх генезис та практичне значення.
87. Характеристика алюмінієвих та фосфатних порід, їх генезис та практичне значення.
88. Загальна характеристика каустобіолітів, їх генезис. Проблема походження нафти.
89. Практичне значення каустобіолітів.
90. Загальна характеристика процесу метаморфізму. Кругообіг речовини в земній корі.
91. Фактори метаморфізму, їх характеристика. Класифікація метаморфічних процесів.
92. Характеристика локального метаморфізму. Породи контактового і катакластичного.
93. Характеристика регіонального метаморфізму. Породи регіонального метаморфізму.
94. Ультраметаморфізм. Анатексис, палінгенез, гранітизація. Породи ультраметаморфізму.
95. Структура і текстура метаморфічних порід. Форми залягання метаморфічних порід.
96. Роль метаморфізму в утворенні корисних копалин. Родовища метаморфічного генезису.

ЛІТЕРАТУРА

1. Біленко Д.К. Основи геології і мінералогії / Д.К. Біленко. – К. : Радянська школа, 1961. – 376 с.
2. Бондарев В.П. Основы минералогии и кристаллографии / В.П. Бондарев. – М. : Высшая школа, 1978. – 192 с.
3. Войлошніков В.Д. Географія корисних копалин та вивчення їх у школі / В.Д. Войлошніков, Н.А. Войлошнікова. – К. : Радянська школа, 1978. – 144 с.
4. Географический атлас для учителей средней школы. – М. : ГУГК, 1981.
5. Гурский Б.Н. Определитель минералов и горных пород / Б.Н. Гурский, К.К. Кудло. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 96 с.
6. Гурский Б.Н., Корулин Д.М. Геология общая и историческая / Б.Н. Гурский, Д.М. Корулин. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 301 с.
7. Вовк В.М. Геологічний словник. – Кіровоград: КОД, 2012. – 504 с.
8. Каденская М.И. Руководство к практическим занятиям по минералогии и петрографии / М.И. Каденская. – М.: Просвещение, 1976 – 240 с.
9. Геологія з основами геоморфології / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко, О.В. Чепіжко, М.Д. Крочак. – Чернівці: Букрек, 2010. – 398 с.
10. Геологія з основами мінералогії: Навч. посібник / Д.Г. Тихоненко, В.В. Дегтярьов, М.А. Щуковський та ін.; За ред. Д.Г. Тихоненка. – К.: Вища освіта, 2003. – 287 с.
11. Музафаров В.Г. Определитель минералов, горных пород и окаменелостей / В.Г. Музафаров. – М. : Недра, 1979. – 327 с.
12. Музафаров В.Г. Минералогия и петрография / В.Г. Музафаров. – М. : Просвещение, 1964. – 176 с.
13. Кратенко Л.Я. Общая геология: Учебное пособие. – Днепропетровск: НГУ, 2008. – 196 с.
14. Павлинов В.Н. Основы геологии / В.Н. Павлинов, Д.С. Кизевальтер, Н.Г. Глин. – М. : Недра, 1991. – 270 с.
15. Паранько І.С. Загальна геологія : [навч. посібник] / І.С. Паранько, А.О. Сіворонов, В.Д. Євтехов. – Кривий Ріг : Мінерал, 2003. – 464 с.
16. Паранько І. Геологія з основами геоморфології : [навч. посібник] / І. Паранько, А. Сіворонов, О. Мамедов. – Кривий Ріг : Мінерал, 2008. – 365 с.
17. Пічугін Б.В. Шкільний визначник мінералів і гірських порід / Б.В. Пічугін, Ю.І. Федченко. – К.: Радянська школа, 1982. – 135 с.
18. Сивий М.Я. Геологія : [підручник] / М.Я. Сивий, Й.М. Свинко. – К.: Либідь, 2003. – 480 с.
19. Сивий М.Я. Геологія: Практикум : [навч. посібник] / М.Я. Сивий, Й.М. Свинко. – К.: Либідь, 2006. – 248 с.
20. Общая геология. В 2 тт. Т.1: Учебник / Под ред. А.К.Соколовского. – М.: КДУ, 2006. – 448 с.