

ECOLOGY

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-111-4-9>

УШКОДЖЕННЯ ТВЕРДОГО ТІЛА ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ РОДИНИ КУЛЬКОВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: PISIDIDAE) ЯК РЕЗУЛЬТАТ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Билина Л. В.

аспірант

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Шевчук Л. М.

доктор біологічних наук, професор

Житомирський державний університет імені Івана Франка

м. Житомир, Україна

Зростання антропогенного впливу на прісноводні гідро екосистеми позначаються не лише на якісному та кількісному складі зооценозів, а на особливостях процесів життєдіяльності гідробіонтів. Серед прісноводних двостулкових молюсків, представлених на території України, слід відмітити перлівницевих (Unionidae) та кулькових (Pisidiidae). Вони є природними фільтраторами водних об'єктів. Ці молюски живляться частинками органічних речовин, дрібним планктоном і тому відіграють істотну роль у біологічному очищенні вод [2]. Перлівницеві – це найбільші двостулкові м'якуни водойм та водотоків України, кулькові – найдрібніші представники двостулкових молюсків, які зараз є малочисельними. Чіткої думки щодо кількості видів кулькових в Україні не існує, за різними таксономічними підходами їх вказують від 16 до 74 видів [2,3,4,5]. Молюски родини Pisidiidae в Україні, за літературними даними [4], представлені трьома родами: *Sphaerium*, *Musculium*, *Pisidium* (*Euglesa*). Зрозуміло, що при погіршенні екологічного стану водойм, неможливо не замислюватись над питаннями умов існування гідробіонтів, їх чисельності, щільності поселень, різноманіття видового складу поселень.

Метою даної роботи було з'ясування видового різноманіття кулькових Житомирського Полісся та вивчення травматичної мінливості твердого тіла (черепашки), яке найбільше контактує із змінним середовищем існування. До травматичної мінливості двостулкових молюсків можна віднести випадки прижиттєвої корозії

черепашки, зміну її первинного кольору, які викликаються особливостями хімічного складу водного середовища [1], а також забрудненням води, утворення скульптурних пустотілих розростань (здуття) внутрішнього шару черепашки (гіпоостракуму), спричинених зростанням каламутності води і, як наслідок, подразненням тіла дисперсними частинками, а також деформування черепашки, спричинені механічними впливами. Усі ці зміни були відмічені нами у перлівницевих, які мають більшу, ніж кулькові тривалість життя, й, тому, більшу ймовірність зазнати впливу забрудненого середовища.

Матеріалом даної роботи слугували кулькові родів: *Sphaerium*, *Pisidium* (*Euglesa*), зібрані протягом 2019-2020 рр. на території Житомирської області.

Загалом обстежено 1240 екземплярів черепашок семи видів кулькових, а саме: *Sp. corneum* Linnaeus, 1758, *Sp. solidum* Normand, 1844, *Sp. rivicola* Lamarck, 1818, *Sp. nitidum* Clessin, 1876, *Sp. nucleus* Studer, 1820, *P. amnicum* Muller, 1774, *P. supinum* Schmidt, 1851. Досліджених представників було зібрано із 21 пункту у межах Житомирської області, розташованих у 2 річкових басейнах. Інформацію про матеріал дослідження наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Пошкодження твердого тіла молюсків сучасних водойм та водотоків Житомирської області

Вид молюска	Кількість досліджених особин, екз	Аномалії в будові черепашки		
		Скульптурні утворення гіпоостракуму, екз (%)	Деформація черепашки, екз (%)	Зміна первинного кольору гіпоостракуму, екз (%)
<i>Sp. rivicola</i>	759	–	128(17)	–
<i>Sp. nucleus</i>	308	–	16 (5)	–
<i>P. amnicum</i>	40	–	1 (2,5%)	–
<i>Sp. corneum</i>	22	–	–	–
<i>Sp. solidum</i>	22	–	–	–
<i>Sp. nitidum</i>	61	–	–	–
<i>P. supinum</i>	28	–	–	–

Збір, транспортування та утримання кулькових здійснювався згідно загальноприйнятих методик [4]. Також обстежено черепашки 262 екземплярів молюсків родини *Sphaerium*, *Pisidium* (*Euglesa*) Державного природознавчого музею НАН України (м. Київ та м. Львів). Для аналізу відібрано матеріал, який було зібрано до 1914 року, тобто до значних зрушень у гідроценозах. У ході дослідження використовувався метод визначення виду досліджуваних тварин, а також візуального обстеження черепашок молюсків з метою виявлення каліцтва та аномалій. Корозію черепашки внаслідок впливу рН середовища, що спостерігається в нормі у водоймах півночі Поліського регіону ми не аналізували.

Аналіз травматичної мінливості твердого тіла кулькових показав, що травматичний характер проявлявся тільки механічним пошкодженням (деформацією) черепашки (рис.1), зміни первинного кольору та скульптурні утворення гіпоостракуму не спостерігалося.



Рис. 1 Пошкодження черепашки *Sp. rivicola* із річки Гнилоп'ятка

Для перевірки цих даних, ми також проаналізували малакологічні колекції молюсків родів: *Sphaerium*, *Pisidium* (*Euglesa*) та *Musculium* Державного природознавчого музею НАН України (м. Київ та м. Львів). Для аналізу було відібрано матеріал, зібраний до 1914 року. Візуальне обстеження черепашок дозволило встановити, що кулькові з музейних колекцій також мали лише механічні пошкодження черепашки, а зміни первинного кольору та скульптурні утворення гіпоостракуму також не були виявлені. Загалом відсоток особин з деформацією черепашки у мізейних колекціях не перевищував 5%.

Отже, загалом при обстеженні *Sp. rivicola* механічні ушкодження черепашки мали 128 тварин із 759 обстежених, що становить 17% та 16 екземплярів *Sp. nucleus* із 308 обстежених, що становить 5%. При обстеженні *P. atticum* було виявлено тільки 1 незначну деформацію

черепашки із 40 досліджених тварин, що становить 2,5%. Ушкодження черепашки реєструвалось тільки в дорослих особин, тобто не є вродженими, а виникає на певних стадіях індивідуального розвитку під дією чинників середовища.

Таблиця 2

Пошкодження твердого тіла молюсків конкретних пунктів збору водойм та водотоків Житомирської області

Місце збору	Кількість досліджених особин, екз	Ушкодження твердого тіла		
		Скульптурні утворення гіпоостракуму, екз	Деформація черепашки екз	Зміна первинного кольору гіпоостракуму, екз
<i>Sphaerium rivicola</i>				
Річковий басейн Прип'яті				
смт. Миропіль, річка Случ	10	–	2	–
Річковий басейн Дніпра				
с. Чоповичі, р. Ірша	6	–	2	–
с. Рея, річка Гнилоп'ятка	447	–	107	–
с. Мирославка, річка Гнилоп'ятка	24	–	6	–
м. Житомир, р. Кам'янка	17	–	4	–
с. Глибочок, р. Ів'янка	29	–	7	–
<i>Sphaerium nucleus</i>				
Річковий басейн Дніпра				
с. Глибочок, р. Ів'янка	167	–	16	–
<i>Pisidium amnicum</i>				
Річковий басейн Дніпра				
с. Бондарці, р. Лісова	1	–	1	–

Література:

1. Гідрохімія та радіогеохімія річок і боліт Житомирської області: Монографія / С.І. Сніжко, О.О. Орлов, Д.В. Закревський та ін. Житомир: Волинь, 2002. 264 с.

2. Жадин В.И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР. Москва – Ленинград : изд-во АН СССР. 1952. 376 с.
3. Korniuszin A.V., Yanovich L.N., Melnichenko R.K. Artenliste der Süßwassermuscheln der Ukraine. Mit Bemerkungen über taxonomischen Status, Verbreitung und Gefährdungskategorien einiger Arten und Formen. ConchBooks : Friedrich-HeldGesellschaft, 2002. S. 463–478.
4. Стадниченко А. П. Фауна України. Перлівницеві. Кулькові (Unionidae, Cykladidae). К. :Наук. думка, 1984. Т. 29. Вип. 9. 384с.
5. Piechocki A. Dyduch-Falniowska A. Mięczaki (Mollusca), małże (Bivalvia). Fauna słodkowodna Polski, z. 7A. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993. 202 pp.