

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ МОЛЛЮСКОВ РОДОВ PSEUDANODONTA И ANODONTA (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE: ANODONTINAE) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНЫ

Изучено распространение и экология моллюсков родов *Pseudanodonta* и *Anodonta* бассейна Днепра Украины. Встречаемость *P. complanata* составляет 13,58, *A. cygnea* – 19,75, *A. anatina* – 60,49%. Отмечено сокращение ареала *P. complanata* и *A. cygnea*. Среди исследованных видов наибольшая экологическая пластичность характерна для *A. anatina*.

Ключевые слова: фауна, распространение, экологические спектры, моллюски родов *Pseudanodonta*, *Anodonta*, бассейн Днепра Украины

Первые сведения о пресноводной малакофауне Украины, в том числе и бассейна Днепра, датируются первой половиной XIX ст. Моллюсков Лесостепной и Степной зон Украины изучали достаточно много малакологов [2, 9, 12, 13, 15]. В 30–40-х гг. XX ст. значительно расширились исследования, которые характеризовали не только видовой состав, но и распространение, экологию мягкотелых Полесья, Лесостепи [4, 7]. Они активизировались в 60–80-х гг. того же столетия [5, 8, 10]. При этом обращалось внимание на качественное и количественное изменение малакоценозов в сравнении с довоенными годами, обусловленное все возрастающим антропогенным влиянием на них.

На сегодня из-за общей деградации водных экосистем Украины изучение видового состава, распространения, экологии перловицевых приобрело особую потребность и актуальность.

Материал и методы исследований

Исследовано свыше 80 пунктов в бассейне Днепра. Сборы осуществляли в мае-октябре 2008-2009 гг. Моллюсков добывали вручную и определяли видовую принадлежность [6, 14]. Плотность населения популяций определяли методом площадок [5]. Рассчитывали встречаемость видов. Оценивали гидрологические особенности (температуру, скорость течения, глубину, прозрачность, характер донных отложений, наличие водной растительности) мест обитания перловицевых. В 37 пунктах сбора взяты пробы воды. Анализы воды осуществляли по общепринятым методикам [1].

Результаты исследований и их обсуждение

В бассейне Днепра нами обнаружено три вида перловицевых родов *Pseudanodonta*, *Anodonta*: *Pseudanodonta complanata* Rossmassler, 1835; *Anodonta cygnea* Linnaeus, 1758 и *A. anatina* (= *piscinalis*) Nilsson, 1822.

P. complanata выявлен ранее [5, 10] не только в реках бассейна Днепра, но и в озерах, в Кременчугском и Каховском водохранилищах (рис. 1).



Рис. 1. Распространение *P. complanata* в бассейне Днепра Украины: ▲ – литературные данные; ○ – собственные данные (черные – обнаружен, серые – не найден)

Нами зарегистрирована самая низкая среди беззубок (13,58%) встречаемость этого вида в бассейне Днепра. Обнаружен только на правом берегу Верхнего Днепра и в бассейне Среднего Днепра. Выявлен в реках с песчано-илистым дном при среднем течении (0,1–1,0 м/с) на глубине 0,7–1,5 м. Активная реакция среды составляет 7,1–7,82, содержание кислорода 6,43–30,53 мг/дм³. Перманганатная окисляемость – 12 мг/дм³. Плотность поселения моллюсков невысока (до 4 экз./м²), хотя преимущественно обнаружены единичные экземпляры. В 6,17% случаев найден совместно с *A. anatina*.

A. cygnea отмечен в XX ст. [10, 11] не только в Днепре на речных участках, но и в Кременчугском, Днепродзержинском, Каховском водохранилищах, озерах, прудах (рис. 2).



Рис. 2. Распространение *A. cygnea* в бассейне Днепра Украины: ▲ – литературные данные; ○ – собственные данные (черные – обнаружен, серые – не найден)

По нашим данным, сейчас в бассейне Днепра вид редкий (частота встречаемости – 19,75%). Обнаружен, как и предыдущий вид, только в пределах правобережной части верхнего и среднего Днепра. Отмечен в рипали (глубина 0,5–1,5 м) рек, в озерах и прудах. Отдает предпочтение среднему, иногда медленному течению, однако, обнаружен и в стоячей воде (оз. Каменное, Радомышль Житомирской обл.; пруды, Романов, Ружин, Забриддя Житомирской обл.). Сосредоточен на песчано-илистых, песчано-каменистых с наилением донных отложений, на участках без ила, или с его значительным количеством, не встречается. Отмечен в пределах рН 7,37–8,65. Выдерживает содержание O₂ от 2,94 мг/дм³ до 21,42 мг/дм³ (насыщенность воды – 30,18–219,92%), что отличается от литературных данных [10]. Как и предыдущий вид, в 90% случаев найден при перманганатной окисляемости 12 мг/дм³. Ни в одном из случаев плотность населения его популяций не превышала 4 экз./м², в преобладающем большинстве попадалось всего лишь 1–2 особи. В 70% пунктов сбора выявлен совместно с *A. anatina*.

A. anatina (= *piscinalis*) – эвритопный вид. Выявлен в Днепре, его водохранилищах и притоках (рис. 3) [11].



Рис. 3. Распространение *A. anatina* в бассейне Днепра Украины: ▲ – литературные данные; ○ – собственные данные (черные – обнаружен, серые – не найден)

Результаты наших исследований подтвердили широкую экологическую пластичность *A. anatina* и наивысшую частоту встречаемости среди беззубок – 60,49%. Это единственный вид среди моллюсков родов *Pseudanodonta*, *Anodonta*, отмеченный нами в бассейне всего Днепра, выявленный в реках, озерах и водохранилищах (Маккортское, Днепровское). Часто поселяется на

участках со стоячей водой или с медленным течением, однако, не избегает и скорости течения до 1,5 м/с. В последнем случае почти полностью зарывается в донные отложения. Отмечен на разных, часто сильно заиленных донных отложениях. Может встречаться на мелководье (глубина 10–15 см), что не отмечалось ранее, и на глубинах до 2 м. Нами отмечен при pH от 7,07 (р. Уж, Коростень Житомирской обл.) до 8,65 (р. Сула, Лубны Полтавской обл.), то есть выдерживает больший, чем указывается в литературе, диапазон этого показателя. Зарегистрирован при значительных колебаниях содержания кислорода в воде – 2,94–37,62 мг/дм³ (насыщенность – 30,18–386,24%), что также отличается от литературных данных. Это единственный среди беззубок вид, который выдерживает максимальную перманганатную окисляемость. В 25% пунктов зарегистрировано значение этого показателя 16 мг/дм³, в около 40% – 12 мг/дм³. Именно такая выносливость моллюска объясняет тот факт, что он может жить там, где другие близкие ему виды не встречаются.

По экологической пластичности близок к *U. timidus* Philipsson, 1788 и *U. pictorum* Linnaeus, 1758, поэтому наиболее часто совместно с этими видами и поселяется. Правда, плотность его поселения почти всегда им уступает, не превышая 10–12 экз./м². Средние значения этого показателя – 5 экз./м².

Выводы

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в бассейне Днепра сократился ареал *P. complanata* и *A. cygnea*. Их не обнаружено в бассейне нижнего Днепра. Вероятной причиной этого является неспособность этих видов моллюсков обитать в антропогенно измененных водных экосистемах. Наименее устойчивым к колебаниям значений экологических факторов является вид *P. complanata*. Для *A. anatina* характерна значительная экологическая пластичность, что дает возможность этому виду адаптироваться к изменениям условий обитания. Этот вид найден в Днепровском водохранилище, а в Каховском и Кременчугском – выявлены только обломки раковин этого же вида.

1. Алексин О.А. Гидрохимия рек СССР / О.А. Алексин. – Л.: Гидрометеорол. изд-во, 1948. – 184 с.
2. Ельский К.М. О малакологической фауне окрестностей г. Киева / К.М. Ельский // Изв. ун-та Св. Владимира. – 1862. – № 8. – С. 187–194.
3. Жадин В.И. Фауна СССР. Моллюски. Сем. Unionidae. Т. IV. / В.И. Жадин. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1938. – 172 с.
4. Жадин В.И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР / В.И. Жадин. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – 376 с.
5. Иванчик В.В. Особенности распространения моллюсков семейства Unionidae в Кременчугском водохранилище / В.В. Иванчик // Вестн. зоологии. – 1975. – № 6. – С. 82–84.
6. Корнюшин А.В. О видовом составе пресноводных двусторчатых моллюсков Украины и стратегии их охраны / А.В. Корнюшин // Вестн. зоологии. – 2002. – № 36. – С. 9–23.
7. Полянський Ю. Матеріали до пізнання малакофауни Західного Полісся / Ю. Полянський // 36. фізіографіч. комісії Т-ва ім. Т.Г. Шевченка у Львові. – 1933. – Вип. 4/5. – С. 83–100.
8. Путь А.Л. Порівняльна колекція сучасних моллюсків відділу палеозоології Інституту зоології АН УРСР / А.Л. Путь // 36. праць зоол. музею АН УРСР. – 1954. – № 26. – С. 97–118.
9. Рябинин И.В. Влияние текучей воды на форму Unionid (Моллюски Большого Банного озера) / И.В. Рябинин. – Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1889. – 31 с.
10. Стадниченко А.П. Фауна України. Перлівнищеві. Кулькові. Т. 29 / А.П. Стадниченко. – К.: Наук. думка, 1984. – 384 с.
11. Цееб Я.Я. Систематико-екологічний огляд безхребетних Каховського водоймища / Я.Я. Цееб, Г.А. Оліварі, В.В. Гурвич // Каховське водоймище. – К.: Наук. думка, 1964. – С. 290–295.
12. Belke G. Quelques mots sur le slimak et la faune de Kamienetz-Podolski / G. Belke // Bull. Soc. Imp. de Mosc. – 1853. – Vol. 26. – P. 410–437.
13. Clessin S. Anhang zur Molluskenfauna der Krim / S. Clessin // Malakozoologische Blätter. – 1883. – Vol. 6. – S. 37–52.
14. Glöer P. Süßwassermollusken / P. Glöer, C. Meier-Brook. – Hamburg: DJN, 1998. – 136 s.
15. Retowski O. Die Molluskenfauna der Krim / O. Retowski // Malakozool. Blät. – 1883. – Vol. 8. – S. 1–34.

М.М. Пампура, Л.М. Янович

Житомирський державний університет ім. Івана Франка, Україна

ПОШИРЕННЯ І ЕКОЛОГІЯ МОЛЮСКІВ РОДИН PSEUDANODONTA І ANODONTA
(MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE: ANODONTINAE) В БАСЕЙНІ ДНІПРА В МЕЖАХ
УКРАЇНИ

Вивчені поширення та екологія молюсків родів *Pseudanodonta* і *Anodonta* басейну Дніпра України. Трапляння *P. complanata* становить 13,58, *A. cygnea* – 19,75, *A. anatina* – 60,49%. Відмічено скорочення ареалу *P. complanata* та *A. cygnea*. Серед досліджених видів найбільша екологічна пластичність характерна для *A. anatina*.

Ключові слова: фауна, поширення, екологічні спектри, молюски родин *Pseudanodonta*, *Anodonta*, басейн Дніпра України

M.M. Pampura, L.M. Yanovich

Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

DISTRIBUTION AND ECOLOGY MOLLUSKS OF BIRTHS OF PSEUDANODONTA AND
ANODONTA (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE: ANODONTINAE) IN POOL OF
DNIPIER WITHIN THE LIMITS OF UKRAIN

The distribution and ecology of *Pseudanodonta* and *Anodonta* genera mollusks in the Dniپر basin of Ukraine are researched. The occurrence of *P. complanata* – 13,58, *A. cygnea* – 19,75, *A. anatina* – 60,49%. The decrease of *P. complanata* and *A. cygnea* areals is registered. Amongst the researched species *A. anatina* is characterized with the highest ecological plasticity.

Key words: fauna, distribution, ecological spectrums, mollusks, *Pseudanodonta*, *Anodonta*, Dnieper