

**М.В. Лебедь, О.В. Гарбар, Д.А. Гарбар** **ФАУНА П'ЯВОК МЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ВИДОВИЙ СКЛАД ТА БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ // Біологічні дослідження – 2013:** Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2013. – С.115-116

П'явки (*Hirudinea*) – порівняно невелика, але своєрідна і дуже цікава в біологічному відношенні група, яку виділяють в окремий клас. Вони зустрічаються в багатьох водоймах і безумовно відіграють значну роль в біоценозах. Цих червів споживають деякі види риб та інші водні хребетні. В той же час п'явки завдають шкоди, іноді досить значної. Окремі їх види викликають виснаження і загибель риб і водоплавних птахів. Проникнення п'явок у фільтраційні установки міських водопроводів може серйозно утруднювати роботу останніх [2]. Відомо близько 400 видів п'явок, із них в Україні – близько 30.

Метою дослідження було встановлення видового складу та особливостей біотопічного розподілу п'явок Млинівського району Рівненської області. Матеріалом для дослідження послужили збори п'явок зроблені в липні-серпні 2012 року у водоймах Млинівського району: в смт. Млинів (водосховище), с. Довгошиї (р. Путилівка), с. Смордва (ставок), с. Посників (ставок), с. Привітне (ставок). Загалом було зібрано 42 екземпляри.

Збір матеріалу проводили вручну та фіксували на місці 70 %- ним спиртом. В подальшому матеріал зберігався в темному, недоступному для сонячних променів місці.

Визначення видів проводили за загальноприйнятими методиками [1, 2]. Видовий склад та чисельність п'явок у досліджених водоймах наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

Видовий склад та біотопічний розподіл фауни п'явок Млинівського району Рівненської області

№	Місце збору	Тип водойми	Видова назва	Кількість екземплярів
1.	смт. Млинів	водосховище	<i>Herpobdella octoculata</i>	10
			<i>Glossiphonia complanata</i>	6
2	с. Довгошиї	річка	<i>Herpobdella octoculata</i>	4
3.	с. Смордва	ставок	<i>Batracobdella paludosa</i>	14
			<i>Herpobdella octoculata</i>	1
4.	с. Посників	ставок	<i>Herpobdella octoculata</i>	4
5.	с. Привітне	ставок	<i>Haementeria costata</i>	3

Отже, у результаті дослідження на території Млинівського району Рівненської області було виявлено чотири види п'явок, що належать до двох родин: *Herpobdellidae* та *Glossiphonidae*. Встановлено, що домінуючими видами на цій території є *Herpobdella octoculata* (він поширений в чотирьох з

п'яти досліджуваних водойм) та *Batracobdella paludosa* (вид поширений в одній водоймі, проте його чисельність досить висока у порівнянні з іншими видами). Субдомінантом є п'явка *Haementeria costata*, яку виявлено лише в одній водоймі.

#### Література

1. Кутикова Л.А. Старобогатов Я. И. – Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. – Ленинград: Гидрометеиздат, 1977. – 512 с.
2. Лукін Є.І. – Фауна України: Том 30. П'явки. Зовнішня і внутрішня будова, екологія, систематика, поширення та практичне значення п'явок.–Київ: Вид-во АН УРСР, 1962.–196 с.