

УДК 594.1:591.5

## БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ ВОЛИНСЬКИХ ОЗЕР

А. П. Стадниченко, Р. К. Мельниченко, О. І. Увасва, О. В. Павлюченко

Житомирський державний університет, Житомир, Україна, Uvaeva1980@mail.ru

## BIODIVERSITY OF FRESHWATER MOLLUSCS IN THE VOLYN LAKES

A. P. Stadnychenko, R. K. Melnychenko, O. I. Uvayeva, O. V. Pavlyuchenko

Zhytomyr State University, Zhytomyr, Ukraine, Uvaeva1980@mail.ru

Природа щедро наділила Волинь озерами, яких тут нараховується понад 220. Малакофауна цього регіону численна, різноманітна, але все ще слабко досліджена. Мета нашої роботи – екологічно-фауністичне дослідження прісноводних молюсків озер Волинської області. Матеріалом слугували власні збори авторів, а також польові збори працівників Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Тепер ці матеріали зберігаються у фондах музею природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Автори висловлюють глибоку подяку співробітникам ЖДУ О. В. Гарбару, Г. Є. Киричук, І. О. Першко за допомогу у визначення діяльних видів молюсків.

Збір матеріалу проводили у 2003–2004 рр. на 33 найбільших озерах Волині, серед яких 9 озер Шацької групи (Світязь, Пульмо, Пісочне, Люцимер, Чорне, Згоранське, Соминець, Перемут, Кримне). Молюски збирали вручну та за допомогою сачка. Для визначення видової належності молюсків користувались загальноприйнятими конхіологічними характеристиками (Старобогатов, 1977; Стадниченко, 1984, 1990; Старобогатов и др., 2004).

Малакофауна Шацьких озер представлена 39 видами. Із гастропод в озерах зустрічаються представники 7 родин. Це Viviparidae: *Viviparus viviparus duboisianus* (Mousson, 1863), *V. contectus* (Millet, 1819); Bithyniidae: *Bithynia (Bithynia) tentaculata* (Linnaeus, 1758), *B. (B.) producta* (Moquin-Tandon, 1855), *B. (B.) curta* (Garnier in Picard, 1840), *B. (Miletelona) decipiens* (Millet, 1843); Valvatidae: *Valvata piscinalis* (O. F. Müller, 1774), *V. cristata* (O. F. Müller, 1774); Lymnaeidae: *Lymnaea (Lymnaea) stagnalis* (Linnaeus, 1758), *L. (Radix) auricularia* (Linnaeus, 1758), *L. (Peregrina) peregra* (O. F. Müller, 1774), *Lymnaea (Stagnicola) palustris* (O. F. Müller, 1774), *L. (S.) turricula* (Held, 1836), *L. (Corviniana) corvus* (Gmelin, 1791); Bulinidae: *Planorbarius corneus* (Linnaeus, 1758), *P. purpura* (O. F. Müller, 1774); Acroloxidae: *Arcoloxus lacustris* (Linnaeus, 1758); Planorbidae: *Planorbis planorbis* (Linnaeus, 1758), *Anisus (Anisus) spirorbis* (Linnaeus, 1758), *A. (A.) leucostoma* (Millet, 1813), *A. (A.) perezi* (Graells in Dupuy, 1854), *A. (A.) septemgyratus* (Rossmaessler, 1835), *A. (Discularia) vortex* (Linnaeus, 1758), *A. (D.) vorticulus* (Troschel, 1834), *A. (Bathyomphalus) contortus* (Linnaeus, 1758), *A. (Gyraulus) albus* (O. F. Müller, 1774), *A. (G.) acronicus* (Férussac, 1807), *Armiger crista* (Linnaeus, 1758), Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774), *S. distinguenda* (Gredler, 1859), *Hippeutis fontana* (Lightfoot, 1786).

Серед двостулкових прісноводних молюсків тут відмічено види двох родин. Це Unionidae: *Unio (Unio) pictorum ponderosus* (Spitzi in Rossmaessler, 1844), *U. (Tumidusiana) cornis borysthenicus* (Kobelt, 1879), *U. (T.) tumidus falcatulus* (Drouet, 1881), Colletopterum (*Piscinaliana*) *piscinale falcatum* (Drouet, 1881), *C. (Ponderosiana) ponderosum rumanicum* (Bourguignat, 1880), *Anodonta (Anodonta) cygnea* (Linnaeus, 1758); Sphaeriidae: *Euglossa (Hiberneuglossa) hibernica* (Westerlund, 1894), *E. (H.) lilljeborgii* (Clessin, 1886).

Слід відмітити, що безпосередньо у озерах знайдено невелику кількість двостулкових молюсків, а гастроподи тут взагалі майже відсутні. Адже в озерах температура води здебільшого невисока, у них дуже слабко розвинена водна рослинність, донні відкладення здебільшого піщані, у прибережній зоні наявний інтенсивний рух води. Такі умови середовища вкрай несприятливі для стагнофільних видів молюсків (котушкові, витушкові,

ставковикові, живородкові тощо). Проте більшість цих видів знаходять дуже сприятливі умови для свого розвитку у водоймах, розташованих на узбережжі цих озер (невеличкі тимчасові водойми, калюжі, канали, меліоративні каналі), про що свідчать високі показники щільності поселення цих тварин. Так, у напівпересохлих бутонах поблизу оз. Світязь зареєстровано найбільшу щільність поселення *P. planorbis* по всій Україні – близько 28 тис. екз./м<sup>2</sup>. Адже тут відсутня течія, багата водяна рослинність, мулисті донні відкладення, добре прогріта вода. Все це створює сприятливі умови для поселення тут молюсів та для значного їх кількісного розвитку. Малакофауна інших озер, обстежених на Волині, представлена 18 видами черевоногих і 11 видами двостулкових молюсів, список яких наведено нижче.

Оз. Біле (с. Невір, Любешівський р-н): *B. (B.) tentaculata*, *V. viviparous duboisianus*, *V. contextus*, *L. (R.) auricularia*, *P. corneus*, *P. planorbis*, *P. carinatus*, *A. (A.) spirorbis*, *A. (A.) cygnea*, *U. (U.) pictorum ponderosus*. Тут вперше для даного регіону виявлено представника родини *Dreissenidae* – *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771), який, вірогідно, дістався сюди з території Білорусі.

Оз. Бурків (Любешівський р-н): *V. contextus*, *L. (L.) stagnalis*, *P. corneus*, *P. planorbis*, *U. (U.) pictorum ponderosus*, *A. (A.) zellensis* (Schröter, 1779).

Оз. Віпак (с. Величне): *V. contextus*, *L. (L.) stagnalis*, *L. (R.) ampla* (Hartmann, 1821), *L. (R.) balthica* (Linnaeus, 1758), *P. corneus*, *P. planorbis*, *A. (A.) zellensis*, *Sphaerium (Amesoda) rivicola* (Lamarck, 1818).

Оз. Глухівське (с. Глухи, Старовижівський р-н): *B. (B.) tentaculata*, *R. (L.) auricularia*, *P. corneus*, *U. (T.) tumidus*, *A. (A.) cygnea*, *C. (P.) piscinale falcatum*.

Оз. Оріхівське (с. Самари-Оріхові, Ратнівський р-н): *V. contextus*, *L. (L.) stagnalis*, *L. (C.) corvus*, *L. (S.) palustris*, *L. (R.) ampla*, *L. (R.) balthica*, *L. (R.) auricularia*, *P. corneus*, *A. (D.) vortex*.

Оз. Даще (с. Даще): *V. contextus*, *L. (C.) corvus*, *L. (S.) palustris*, *L. (R.) ampla*, *L. (R.) auricularia*, *P. corneus*, *A. (A.) cygnea*, *Pseudanodonta complanata* (Rossmaessler, 1835).

Оз. Добре (Камінь-Каширський р-н): *V. contextus*, *L. (L.) stagnalis*, *L. (R.) ampla*, *P. corneus*, *P. planorbis*, *U. (U.) pictorum ponderosus*, *A. (A.) cygnea*, *E. (H.) lilljeborgii*.

Оз. Домашнє (поблизу с. Яревище, Старовижівський р-н): *P. corneus*.

Оз. Заболоття (с. Заболоття, Ратнівський р-н): *B. (B.) tentaculata*, *Valvata trochoidea* (Menke, 1857), *L. (L.) stagnalis*, *P. corneus*, *A. (A.) spirorbis*, *A. (D.) vortex*, *A. (D.) vorticulus*, *A. (B.) contortus*, *S. nitida*.

Оз. Засвяття (с. Засвяття): *V. contextus*, *L. (L.) stagnalis*, *L. (S.) corvus*, *L. (S.) palustris*, *L. (R.) auricularia*, *P. corneus*, *A. (A.) cygnea*.

Оз. Любана (с. Замшани, Ратнівський р-н): *L. (L.) stagnalis*, *P. corneus*, *U. (T.) tumidus*, *A. (A.) cygnea*, *P. complanata*.

Оз. Люб'язь (с. Люб'язь, Любешівський р-н): *L. (L.) stagnalis*, *A. (A.) cygnea*, *C. (P.) piscinale falcatum*.

Оз. Мішане (с. Гірчики): *V. contextus*, *L. (R.) balthica*, *L. (R.) auricularia*, *P. corneus*, *A. (A.) zellensis*.

Оз. Острівне (с. Любочіна, Ратнівський р-н): *L. (L.) stagnalis*, *P. corneus*, *U. (U.) pictorum ponderosus*.

Оз. Піщане (села Кричне і Буцні, Старовижівський р-н): *B. (B.) tentaculata*, *V. contextus*, *L. (L.) stagnalis*, *L. (C.) corvus*, *L. (S.) palustris*, *L. (R.) ampla*, *L. (R.) auricularia*, *P. corneus*, *P. planorbis*, *A. (A.) spirorbis*, *A. (A.) cygnea*, *U. (U.) pictorum ponderosus*, *U. (T.) tumidus*.

Оз. Річицьке (с. Річиця, Ратнівський р-н): *B. (B.) tentaculata*, *V. contextus*, *L. (L.) stagnalis*, *L. (R.) balthica*, *L. (R.) auricularia*, *P. corneus*, *P. planorbis*, *A. (A.) spirorbis*.

Оз. Рогізне (Любешівський р-н): *V. contextus*, *L. (L.) stagnalis*, *P. corneus*, *A. (A.) cygnea*, *U. (T.) tumidus*, *Batavusiana nana carneata* (Küster, 1878).

Оз. Святе (Камінь-Каширський р-н): *V. contextus*, *L. (C.) corvus*, *L. (R.) ampla*,  
*L. (R.) balthica*, *P. corneus*, *P. planorbis*, *A. (A.) cygnea*, *Sph. (A.) rivicola*, *Pisidium amnicum*  
(O. F. Müller, 1774).

Оз. Синове (Старовижівський р-н, с. Синове): *V. contextus*, *L. (L.) stagnalis*, *P. corneus*.

Оз. Скомир (Камінь-Каширський р-н): *L. (L.) stagnalis*, *A. (A.) cygnea*.

Оз. Стовбиківське (Камінь-Каширський р-н): *V. contextus*, *L. (L.) stagnalis*, *P. corneus*,  
*A. (A.) zellensis*, *U. (U.) pictorum ponderosus*.

Оз. Тур (с. Тур, Ратнівський р-н): *V. contextus*, *B. (B.) tentaculata*, *L. (L.) stagnalis*,  
*L. (C.) corvus*, *L. (R.) auricularia*, *L. (R.) balthica*, *P. corneus*, *P. planorbis*, *A. (A.) spirorbis*,  
*A. (A.) cygnea*, *U. (U.) pictorum*, *U. (T.) tumidus*, *E. (H.) lilljeborgii*.

Оз. Черське (с. Глухи, Старовижівський р-н): *U. (U.) pictorum*, *U. (T.) tumidus*,  
*P. complanata*.