

# ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

УДК 594.1:591.5

А.П. Стадниченко,  
доктор біологічних наук, професор;  
Л.М. Янович,  
кандидат біологічних наук, доцент  
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)

## ВПЛИВ ФЕНОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НА ВМІСТ МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ В ОРГАНАХ *UNIONUS CONUS* (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE)

У статті досліджено вплив гідрохіону (2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК) на вміст молочної кислоти в органах (гепатопанкреас, гонада) *U. conus* за різної тривалості експозиції (1, 7, 14 діб). З'ясовано, що гідрохіон в усіх цих концентраціях спричиняється до розвитку у молюсків патологічного процесу, якщо тривалість експозиції становить 14 діб.

Проблема фенольного забруднення природних вод стала актуальною з другої половини ХХ ст. як в Україні, так і за її межами. Не втратила вона своєї актуальності й до наших днів, оскільки у скидах багатьох промислових підприємств (нафтопереробні, газові, коксобензольні, хімічні, деревопереробні, текстильні, фармацевтичні, шкіряні та ін.) містяться фенол і його гомологи, які з неочищеними або недостатньо очищеними стічними водами надходять у річки і водойми їх придаткової системи. Рівень гранично допустимої концентрації (ГДК) фенолів становить 0,001 мг/л, однак фенольне забруднення чималої кількості водойм нерідко перевищує цей рівень. Останній у межах одного і того ж біотопу не залишається стабільним. Через поступальний рух води в річках відбувається розведення стічних вод. Якщо ж забруднення має залишковий характер, то після кожного наступного скиду відбувається поновне зростання концентрації токсиканту у воді.

Феноли, особливо гідрохіон, дуже небезпечні для прісноводних молюсків [1]. Вони викликають у них не тільки поведінкові і фізіологічні зрушенні, але й зрушенні біохімічні.

Мета нашого дослідження – з'ясувати, як впливають на вміст молочної кислоти (МК) в органах перлівниць різні концентрації гідрохіону (вище за ГДК) залежно від тривалості перебування молюсків у токсичному середовищі. Отримані результати можуть бути використані при створенні інтегрованої (екологічної) системи ГДК.

Матеріалом для дослідження слугували 80 екз. перлівниці борисфенової *Unio conus borysthenicus* Kobelt, 1879 3-4-літнього віку, зібраних у р. Тетерів (у міській смузі Житомира) у жовтні-квітні 2004-2005 pp.




Рис. 1. Вміст молочної кислоти в органах *U. conus* в нормі та за дії гідрохіону (2 ГДК):  
А – самці; Б – самки.

Вік тварин визначали за кількістю темних дуг зимового припинення росту на стулках їх черепашок [2], а стать – анатомуванням. Для біохімічних аналізів вирізали гонади і гепатопанкреас, у гомогенатах яких встановлювали вміст МК [3]. Усього виконано 320 аналізів. У токсикологічних дослідах перлівниць експонували протягом 1, 7, 14 діб у розчинах гідрохіону (ч. д. а), концентрація

яких відповідала 2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК. Їх готували на дехлорованій відстоюванням (1 доба) водопровідній воді. Заміна "відпрацьованих" розчинів свіжими здійснювалась щодоби.

Цифрові результати дослідів оброблено методами варіаційної статистики за Б.Ф. Лакіним [4].

За сприятливих умов середовища вміст МК (ммоль·год/1 г сирої маси) становить: у гепатопанкреасі –  $0,32 \pm 0,043$  (самки) і  $0,235 \pm 0,025$  (самці); у гонаді –  $0,221 \pm 0,041$  (самки) і  $0,157 \pm 0,034$  (самці). Як бачимо, в обох досліджених органах вміст МК значно вищий у самок порівняно із самцями ( $P > 99,9\%$ ).

У середовищі з концентрацією гідрохіона у 2 ГДК на кінець першої доби досліду вміст МК знижується статистично вірогідно і в гепатопанкреасі, і в гонаді (рис. 1). Причому зменшення вмісту МК у самців є набагато більшим, ніж у самок (23,8 проти 10%;  $P > 99,9\%$ ). У гонадах же особин різної статі вони відбуваються у різній мірі. А саме: у яєчниках самок вміст МК знижується проти норми на 44% ( $P > 99,9\%$ ), у той час як у самців намічається тенденція до його зростання (різниця між дослідом і контролем становить лише 7%).

Чим пояснюються такі зрушень? Відомо, що енергозабезпечення прісноводних молюсків здійснюється двома шляхами розщеплення основного енергетичного субстрату – вуглеводів. Один з них – це аеробний процес, другий – анаеробний (глікогеноліз, гліколіз). За перебування молюсків у сприятливих умовах домінуючим є аеробний шлях, за несприятливих же умов – шлях анаеробний. Вони тісно пов'язані між собою [5]. А надійним показником ступеня вираженості анаеробного процесу є рівень вмісту в органах і тканинах МК. Зміни його, крім того, свідчать про ступінь і напрямок зрушень аеробного процесу розщеплення вуглеводів. Отже, зменшення вмісту МК, відзначене у гепатопанкреасі і гонаді самок, вказує на те, що в них за 2 ГДК гідрохіону в середовищі відбувається підвищення аеробного обміну вуглеводів. Це відбувається зазвичай на тій стадії патологічного процесу, викликаного отруєнням тварин, який називають [6] фазою стимуляції (правильніше її було б назвати фазою підвищення активності). Інтенсифікація обміну вуглеводів, здійснювана аеробним шляхом, – це неспецифічна захисно-пристосувальна реакція [7], яка дозволяє за рахунок додаткового енергозабезпечення підтримувати перлівницевим життєдіяльність на досить високому рівні. В усякому разі, молюски за цих умов зберігають рухову, трофічну, статеву функції, хоча різною мірою кожну.




Рис. 2. Вміст молочної кислоти в органах *U. conus* в нормі та за дії гідрохіону (5 ГДК):  
А – самці; Б – самки.

Збільшення тривалості експозиції до 7, а потім до 14 діб супроводжується прогресуючим зростанням вмісту МК в обох досліджених органах. Зростання означеного показника відбувається досить стрімко, що добре видно на графіку (рис. 2, 3), в гепатопанкреасі в 1,3 – 1,5, у гонаді – в 1,5 – 2,1 раз (порівняно з даними, отриманими на кінець першої доби досліду) ( $P > 99,9\%$ ). Збільшення вмісту МК свідчить про те, що з 7 по 14 добу експерименту в молюсків "спрацьовує" інша неспецифічна захисно-пристосувальна реакція, яка полягає в переході їх (частковому або повному) від аеробного розщеплення вуглеводів до анаеробного [8; 9]. Це дозволяє їм за зменшення енерговитрат все ж таки зберегти життєдіяльність. Такі тварини втрачають рухову активність, а всі фізіологічні функції зведені в них до мінімуму. Пригнічений стан перлівниць відповідає депресивній фазі процесу отруєння.

У розчинах з вищими концентраціями гідрохіону (5 ГДК і 10 ГДК) відзначено таку ж динаміку вмісту МК і в гепатопанкреасі, і в гонаді, як і в описаному вище випадку. Графіки (рис. 2, 3), які її відображають, мають подібну конфігурацію. На кінець досліду вміст МК в органах *U. conus* має такі

значення: за 5 ГДК гідрохіону у гепатопанкреасі він становить  $0,056 \pm 0,005$  (самки) і  $0,103 \pm 0,033$  (самці), у гонаді –  $0,064 \pm 0,006$  (самки) і  $0,100 \pm 0,023$  (самці). Піднесення вмісту МК в обох досліджених органах у самців більше, ніж у самок. За час досліду в перших з них цей показник зростає в 1,6, у той час як у самців – у 3,25 раз. Це свідчить про більшу резистентність самок порівняно із самцями до дії токсичного чинника.




Рис. 3. Вміст молочної кислоти в органах *U. conus* в нормі та за дії гідрохіону (10 ГДК):  
А – самці; Б – самки.

Отже, гідрохіон у концентраціях, які відповідають 2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК, за 14 діб експозиції спричиняється до розвитку в *U. conus* патологічного процесу, викликаного отруєнням їх згаданим полютантом. Процес отруєння носить фазний характер. Він починається з фази підвищення активності (фаза байдужості відсутнія), яка за збільшення концентрації токсиканта від 2 ГДК до 5–10 ГДК і подовження експозиції з однієї доби до 7–14 діб переходить у більшої частини особин у фазу депресії. У найменш резистентних особин за нею швидко йдуть одна за одною сублетальна і летальна фази.

#### СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

- Стадниченко А.П., Погорелова Н.С., Руденко А.А. Влияние различных концентраций гидрохинона на роговых катушек (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae), инвазированных партенитами *Tylodelphys excavata* (Trematoda, Diplostomatidae) // Паразитология. – 1991. – Т. 25, вып. 5. – С. 462-467.
- Стадниченко А.П. Перлівниціві. Кулькові (Unionidae. Cypridae). – К.: Наук. думка, 1984. – 375 с.
- Горячковский А.М. Справочное пособие по клинической биохимии. – Одесса: ОКФА, 1994. – 364 с.
- Лакин Б.Ф. Биометрия. – М.: Высш. шк., 1973. – 343 с.
- Губський Ю.І. Біологічна хімія. – К. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 508 с.
- Веселов Е.А. Основные фазы действия токсических веществ на организмы / Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. по вопр. водн. токсикологии. – М., 1968. – С. 15-16.
- Хочачка П., Сомеро Дж. Стратегия биохимической адаптации. – М.: Мир, 1977. – 296 с.
- Биргер Т.И. Метаболизм беспозвоночных в токсической среде. – К.: Наук. думка, 1979. – 190 с.
- Маляревская А.Я. Биохимические механизмы адаптации гидробионтов к токсическим веществам // Гидробиол. журн. – 1977. – Т. 21, № 3. – С. 70-72.

Матеріал надійшов до редакції 18.01. 2008 р.

**Стадниченко А.П., Янович Л.Н. Влияние фенольной интоксикации на содержание молочной кислоты в органах перловицы *Unio conus* (Mollusca: Bivalvia: Unionidae).**

Исследовано влияние гидрохинона (2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК) на содержание молочной кислоты в органах (гепатопанкреас, гонада) *Unio conus* при разной продолжительности экспозиции (1, 7, 14 дней). Установлено, что гидрохинон во всех этих концентрациях обуславливает развитие патологического процесса, при продолжительности экспозиции 14 суток.

**Stadnychenko A.P., Yanovych L.M. The Effect of Hydroquinone Impact on the Lactic Acid Level in the Organs of *Unio conus* (Mollusca: Bivalvia: Unionidae).**

The paper studies the effect of hydroquinone (2 LPC, 5 LPC, 10 LPC) on the lactic acid level in the organs (hepatopancreas, gonads) of *Unio conus* under various duration of exposition (1, 7, 14 days). Hydroquinone by all these concentrations stipulates the development at the mollusks of the pathological process under 14 days exposition duration.